

AMOXICILLINE

AMOXICILLINE® CLAMOXYL® 500 mg gélule / 1g comprimé dispersible

Ce médicament est un **antibiotique**

Il ne doit pas être interrompu sans avis médical

INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES



Si vous prenez les médicaments suivants,

Pansements gastriques	GAVISCON® CARBOLEVURE® SMECTA®	Laisser un intervalle de 2h entre ces médicaments et l'amoxicilline
Anti-vitamines K (AVK) Fluindione Warfarine Acénocoumarol	PREVISCAN® COUMADINE® SINTROM®	Réaliser des INR plus fréquemment
Méthotrexate NOVATREX®	Augmentation des effets et de la toxicité du méthotrexate	
Allopurinol ZYLORIC®	Augmentation du risque de réactions cutanées	
Tétracyclines	Doxycycline DOXY®, GRANUDOXY®, TOLEXINE® Lymecycline TETRALYSAL® Minocycline MESTACINE®	Risque de diminution des effets de l'amoxicilline
Antiacides contenant du magnésium ou de l'aluminium	MAALOX® PHOSPHALUGEL® ROCGEL® KEAL®	Laisser un intervalle de 2h entre ces médicaments

Liste non exhaustive

VOTRE POSOLOGIE

.... comprimé(s)/gélule(s) à mg
.... fois par jour **au cours ou en dehors d'un repas**

- Matin Midi Soir
- Pendant jours
Jusqu'au /.... /....

EN CAS D'OUBLI



Si vous avez oublié de prendre une dose, prenez la suivante à l'heure habituelle.

Ne pas doubler la dose suivante pour compenser la dose oubliée

EN CAS DE VOMISSEMENTS

- Si vomissements jusqu'à **1 heure** après la prise :
➔ reprendre l'antibiotique
- Si vomissements plus de **1 heure** après la prise :
➔ ne pas reprendre l'antibiotique

Pendant la durée de votre traitement, **signaler** la prise de ce traitement à tout professionnel de santé que vous consultez.

Ne pas arrêter la prise de ce médicament **avant la date de fin** prescrite par votre médecin.

En cas d'arrêt prématuré du médicament, risque : de reprise de l'infection, d'aggravation de l'état de santé, d'augmentation des résistances de la bactérie.

EFFETS INDÉSIRABLES

Digestifs : Diarrhées, vomissements, nausées, douleurs abdominales, colites

Cutanés : Eruptions cutanées, pustules, taches rouges, urticaires, démangeaisons, prurit, gonflement, **mycose**

Neurologiques : vertiges, céphalées, convulsions

Biologiques : Perturbations au niveau du foie, du rein et sanguin

Liste non exhaustive

PRÉCAUTIONS

Avis médical en cas de :

- **Réaction allergique** (éruption cutanée, taches rouges ou violettes sur la peau, cloques, gonflement, malaise)
- **Diarrhées** sévères et persistantes accompagnées de douleurs abdominales et fièvre.
- **Urines foncées ou selles décolorées**
- **Jaunisse**
- **Difficulté à uriner**

Bien **s'hydrater**

Possible coloration dentaire réversible à l'arrêt : Avoir une bonne hygiène dentaire

Attention à la conduite



INFORMATIONS PRATIQUES

Conserver dans un endroit sec à température ambiante, hors de la vue et de la portée des enfants

Ne pas croquer, ne pas écraser
Avaler avec un grand verre d'eau

Pour le comprimé dispersible, possibilité de le dissoudre complètement dans un verre d'eau, mélanger jusqu'à homogénéité. Avaler immédiatement le mélange.

Délivré **dans votre pharmacie** sur présentation de l'ordonnance de l'hôpital ou de votre médecin traitant

NOTES

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Pour toutes questions supplémentaires :

Site du centre de référence Nord- Ouest pour le traitement des infections ostéo-articulaires complexe : <http://www.crioac.org/>
n° vert : 0805 400 910

Téléphone du service d'hospitalisation :
03.20.44.64.53



Processus de Pharmacie Clinique

Document destiné aux patients de chirurgie orthopédie – traumatologie

Amoxicilline

CLAMOXYL®

Gélule 500 mg

Comprimé dispersible 1 g

Nom :

Prénom :

Date de naissance :/...../.....

Document remis le :/...../.....

Par (fonction):

.....