

AMOXICILLINE + ACIDE CLAVULANIQUE

AUGMENTIN® 500 mg/62,5 mg comprimé ou 1g/125mg sachet-dose

Ce médicament est un **antibiotique**

Il ne doit pas être interrompu sans avis médical

INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES



Si vous prenez les médicaments suivants,

Anti-vitamines K (AVK)	PREVISCAN® COUMADINE® SINTROM®	Réaliser des INR plus fréquemment
Méthotrexate	Augmentation des effets et de la toxicité du méthotrexate	
Allopurinol ZYLORIC®	Augmentation du risque de réactions cutanées	
Mycophénolat emofétil CELLCEPT®	Risque de diminution des effets du Mycophénolat emofétil : Surveillance clinique	
Probenécide BENEMIDE®	Risque d'augmentation de l' effet et de la toxicité de l'Augmentin®	
Antiacides contenant du magnésium ou de l'aluminium	MAALOX® PHOSPHALUGEL® ROCGEL® KEAL®	Laisser un intervalle de 2h entre ces médicaments

Liste non exhaustive

VOTRE POSOLOGIE

.... comprimé(s) ou sachet(s)
à mg / mg
.... fois par jour **au début d'un repas**
 Matin Midi Soir
Pendant jours
Jusqu'au / /

EN CAS D'OUBLI



Si vous avez oublié de prendre une dose, prenez la suivante à l'heure habituelle.

Ne pas doubler la dose suivante pour compenser la dose oubliée

Pendant la **durée de votre traitement**, **signaler** la prise de ce traitement à tout professionnel de santé que vous consultez.

Ne pas arrêter la prise de ce médicament **avant la date de fin** prescrite par votre médecin ou pharmacien.
En cas d'arrêt prématuré du médicament, risque : de reprise de l'infection, d'aggravation de l'état de santé, d'augmentation des résistances de la bactérie.

EFFETS INDÉSIRABLES

Digestifs : Diarrhées, vomissements, nausées, douleurs abdominales, colites

Cutanés : Eruptions cutanées, pustules, urticaires, démangeaisons, prurit, gonflement, **mycoses**

Neurologiques : vertiges, céphalées, convulsions

Biologiques : Perturbations au niveau du foie, du rein, du potassium et sanguin

PRÉCAUTIONS

Réaction allergique (éruption cutanée, Taches rouges ou violettes sur la peau, gonflement, malaise)

Diarrhées sévères et persistantes accompagnées de douleurs abdominales et fièvre

Difficulté à uriner

Bien **s'hydrater**



Attention à la conduite

Avis médical

INFORMATIONS PRATIQUES

Conserver dans un endroit sec à température ambiante, hors de la vue et de la portée des enfants

Ne pas couper, Ne pas croquer, ne pas écraser

Avaler avec un grand verre d'eau

Diluer le sachet-dose dans un verre d'eau

Délivré **dans votre pharmacie** sur présentation de l'ordonnance de l'hôpital ou de votre médecin traitant

NOTES

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Pour toutes questions supplémentaires :

Site du centre de référence Nord- Ouest pour le traitement des infections ostéo-articulaires complexe : <http://www.crioac.org/>
n° vert : 0805 400 910

Téléphone du service d'hospitalisation :
03.20.44.64.53



Processus de Pharmacie Clinique

Document destiné aux patients de chirurgie orthopédie – traumatologie

Amoxicilline - Acide clavulanique

AUGMENTIN®

Comprimé 500mg /62,5 mg

Sachet-dose 1g/125mg

Nom :

Prénom :

Date de naissance :/...../.....

Document remis le :/...../.....

Par (fonction):

.....