

CEFEPIME

CEFEPIME® AXEPIM® Flacon 500mg, 1 g, 2 g Voie intraveineuse et sous cutanée

Ce médicament est un **antibiotique**

Il ne doit pas être interrompu sans avis médical

INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES



Si vous prenez les médicaments suivants,

Anti-vitamines K (AVK)

Fluindione
Warfarine
Acénocoumarol

PREVISCAN®
COUMADINE®
SINTROM®

Réaliser des INR plus fréquemment

Liste non exhaustive

INFORMATIONS PRATIQUES

Les flacons sont à conserver à **température ambiante**, à l'**abri de la lumière** dans son emballage d'origine

Disponible **dans votre pharmacie** sur présentation de l'**ordonnance de l'hôpital**

VOTRE POSOLOGIE

1 injection de g

- Voie intra-veineuse
- Voie sous-cutanée

toutes les heures
soit fois par jour

- Matin
- Midi
- Soir

Pendant jours
Jusqu'au/...../.....

Pendant la durée de votre traitement, **signaler** la prise de ce traitement à tout professionnel de santé que vous consultez.

Ne pas arrêter la prise de ce médicament **avant la date de fin** prescrite par votre médecin.

En cas d'arrêt prématuré du médicament, risque : de reprise de l'infection, d'aggravation de l'état de santé, d'augmentation des résistances de la bactérie.

EFFETS INDÉSIRABLES

Digestifs : Diarrhées, vomissements, nausées

Cutanés : Eruptions cutanées, mycoses

Musculaires : douleur, sensibilité, faiblesse musculaire

Biologiques : Perturbation au niveau du sang (anémie, diminution des plaquettes), du foie

Neurologiques : vertiges, maux de têtes, convulsions (notamment si insuffisance rénale)

Liste non exhaustive

PRÉCAUTIONS GÉNÉRALES

Avis médical :

- Signes d'allergies : éruptions cutanées, fièvre, gonflement
- Diarrhées sévères, persistantes

Interactions possibles avec réactifs de laboratoire : prévenir biologiste

PRÉCAUTIONS SITE D'INJECTION

Rougeur, chaleur, gonflement, sensibilité, douleur, présence pus ou écoulement

↓
Contacter votre infirmier

