

TRIMÉTHOPRIME/SULFAMÉTHOXAZOLE : COTRIMOXAZOLE

BACTRIM® ou BACTRIM FORTE® comprimé

Ce médicament est un antibiotique

Il ne doit pas être interrompu sans avis médical

INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES



Si vous prenez les médicaments suivants,

Pansementsg astriques	GAVISCON® CARBOLEVURE® SMECTA®	Intervalles d'au moins 2 heures avec ces médicaments
Anti- vitamines K WarfarineFluin dione Acénocoumarol	COUMADINE® PREVISCAN® SINTROM®	Diminution de l'effet Réaliser des INR plus fréquemment
Méthotrexate	NOVATREX®	Association interdite Augmentation de la toxicité au niveau du sang du méthotrexate
Ciclosporine	NEORAL®	Dosage plasmatique pendant la durée du traitement et à l'arrêt
Médicaments hyperkaliémants Exemples : Médicaments pour la tension artérielle		Risque augmentation du taux de potassium
Répaglinide GliclazideGlimé pirideGlibencla mide	NOVONORM® DIAMICRON® AMAREL® DAONIL®	Augmentation de leur efficacité Risque d'hypoglycémie

Liste non exhaustive

VOTRE POSOLOGIE

..... comprimé(s)
deà/..... mg
.... fois par jour, **au cours des repas**
 Matin Midi Soir
Pendant jours
Jusqu'au/...../.....

EN CAS D'OUBLI

Si vous avez oublié de prendre une dose,
prenez la suivante à l'heure habituelle.

Ne pas doubler la dose suivante pour comp
la dose oubliée



EN CAS DE VOMISSEMENTS

Si vomissements jusqu'à **2 heures** après la prise :
reprendre l'antibiotique

Si vomissements plus de **2 heures** après la prise :
ne pas reprendre l'antibiotique

Pendant la durée de votre traitement, signaler la
prise de ce traitement à tout professionnel de santé
que vous consultez.

Ne pas arrêter la prise de ce médicament **avant la
date de fin** prescrite par votre médecin.

En cas d'arrêt prématuré du médicament, risque : de
reprise de l'infection, d'aggravation de l'état de
santé, d'augmentation des résistances de la bactérie

EFFETS INDÉSIRABLES

Digestifs : diarrhées, nausées,
vomissements, douleurs estomac

Neurologiques : Tremblements, sifflements,
bourdonnements, engourdissements,
fourmillements

Cutanés : éruptions cutanées, urticaires,
démangeaisons, photosensibilisation


Biologiques : perturbation au niveau du
foie, du rein et du sang, augmentation du
taux de potassium

Liste non exhaustive

PRÉCAUTIONS

**Eviter l'exposition au
soleil** pendant le traitement et les 3
jours suivant l'arrêt.

En cas d'exposition directe: Se
couvrir (chapeaux, vêtements
longs), crème solaire indice IP50+



Avoir un bon apport hydrique,
boire au moins 1,5 à 2L d'eau par
jour

En cas de gastro-entérites : arrêt du
bactrim et contacter votre médecin

Eruptions cutanées, démangeaisons

Fatigue, pâleur, fièvre, saignements
de nez

Jaunisse

Avis
médical

Risque carence en **acide folique** :
supplémentation possible (Spéciafoldine®)

Eviter la consommation d'alcool

INFORMATIONS PRATIQUES

Conserver dans un endroit sec à température ambiante, hors de la vue et de la portée des enfants

Ne pas couper, Ne pas croquer, ne pas écraser

Avaler avec un grand verre d'eau

Délivré **dans votre pharmacie** sur présentation de l'ordonnance de l'hôpital ou de votre médecin traitant

NOTES

Pour toutes questions supplémentaires :

Site du centre de référence Nord- Ouest pour le traitement des infections ostéo-articulaires complexe : <http://www.crioac.org/>
n° vert : 0805 400 910

Téléphone du service d'hospitalisation :
03.20.44.64.53



Processus de Pharmacie Clinique

Document destiné aux patients de chirurgie orthopédie – traumatologie

Sulfaméthoxazole 800g + Triméthoprime 160mg
Cotrimoxazole
BACTRIM FORTE®
Sulfaméthoxazole 400g + Triméthoprime 80mg
Cotrimoxazole
BACTRIM®

Nom :

Prénom :

Date de naissance :/...../.....

Document remis le :/...../.....

Par (fonction):

.....