

# CIPROFLOXACINE

**CIPROFLOXACINE® CIFLOX®** Flacon ou poche 200 mg, 400mg Voie intraveineuse

Ce médicament est un **antibiotique**

**Il ne doit pas être interrompu sans avis médical**

## INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES



Si vous prenez les médicaments suivants,

<b>Méthotrexate</b>	NOVATREX®	Augmentation des effets indésirables du méthotrexate
<b>Ciclosporine</b>	NEORAL® SANDIMMUN® voie intra-veineuse	Dosage plasmatique et surveillance fonction rénale pendant le traitement et à l'arrêt du traitement
<b>Anti-Vitamines K (AVK)</b>  Fluindione Warfarine Acénocoumarol	PREVISCAN® COUMADINE® SINTROM®	Réaliser des INR plus fréquemment
<b>Ropirinole</b>	REQUIP®	Surveillance des effets indésirables de ces médicaments et adaptation posologie avant et après le traitement.
<b>Clozapine</b>	LEPONEX®	
<b>Zolpidem</b>	STILNOX®	Augmentation de son efficacité

Liste non exhaustive

## VOTRE POSOLOGIE

Une injection à .....

Toutes les ... heures

Soit .... fois par jour

Par voie intra-veineuse

Matin                       Midi                       Soir

Pendant ..... jours

Jusqu'au ...../...../.....

## INFORMATIONS PRATIQUES

Les flacons et les poches doivent être conservés dans un endroit sec à température ambiante, dans son emballage d'origine à l'abri de la lumière

Réservé à **l'hôpital ou en hospitalisation à domicile (HAD)**.

## PRÉCAUTIONS SITE D'INJECTION

Rougeur, chaleur, gonflement, sensibilité, douleur, présence pus ou écoulement



Contactez votre infirmier

## EFFETS INDÉSIRABLES

**Douleurs musculaires, articulaires, tendinites** : (tendon d'Achille +++)

**Cutanés** : Eruptions cutanées, urticaires, démangeaisons, **photosensibilisation, mycoses**

**Neurologiques** : Maux de tête, vertiges, somnolence, insomnie, convulsions, troubles de la vision

**Digestifs** : Diarrhées, vomissements, nausées, douleurs abdominales

**Biologiques** : Perturbations au niveau foie, du rein, du bilan sanguin et du potassium

**Cardiaques** : Palpitations, hypotension

**Vasculaires** : Inflammation d'une veine avec  
*Liste non exhaustive*

## PRÉCAUTIONS GÉNÉRALES

Attention à la conduite



**Avis médical** :

- **Douleurs, inflammations tendons** (surtout au niveau du pied) pendant et jusqu'à plusieurs mois après l'arrêt
- Sensation battements du cœur irréguliers ou rapides
- Diarrhées sévères, persistantes

**Eviter l'exposition au soleil** pendant le traitement et les 2 jours suivant l'arrêt.

**En cas d'exposition**: Se couvrir (chapeaux, vêtements longs), crème solaire indice IP50+



Pendant la durée de votre traitement, **signaler** la prise de ce traitement à tout professionnel de santé que vous consultez.

**Ne pas arrêter** la prise de ce médicament **avant la date de fin** prescrite par votre médecin.

En cas d'arrêt prématuré du médicament, risque: de reprise de l'infection, d'aggravation de l'état de santé, d'augmentation des résistances de la bactérie.

**NOTES**

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

Pour toutes questions supplémentaires :  
Site du centre de référence Nord- Ouest pour le traitement des infections ostéo-articulaires complexe : <http://www.crioac.org/>  
n° vert : 0805 400 910

Téléphone du service d'hospitalisation :  
03.20.44.64.53



Document de la Pharmacie Clinique  
Procédure de pharmacovigilance  
orthopédie – traumatologie

**Ciprofloxacine**  
**CIPROFLOXACINE® CIFLOX®**  
**Voie intraveineuse**

Flacon / poche / 200 mg / 400mg

Nom : .....

Prénom : .....

Date de naissance : ...../...../.....

Document remis le : ...../...../.....

Par (fonction): .....

.....