

DAPTOMYCINE

CUBICIN® Flacon 350 mg, 500 mg Voie intraveineuse

Ce médicament est un **antibiotique**

Il ne doit pas être interrompu sans avis médical

INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES



Si vous prenez les médicaments suivants,

Médicaments diminuant le taux de cholestérol

Les statines

Pravastatine
ELISOR®
VASTEN®

Simvastatine
ZOCOR®

Fluvastatine
LESCOL®

Atorvastatine
TAHOR®

Rosuvastatine
CRESTOR®

Augmentation des CPK

(enzyme témoin d'une atteinte musculaire)

Effets musculaires

Surveillance CPK > 1x/semaine

Anti-Vitamines K (AVK)

Fluindione
Warfarine
Acénocoumarol

PREVISCAN®
COUMADINE®
SINTROM®

Réaliser des INR plus fréquemment

Liste non exhaustive

VOTRE POSOLOGIE

1 injection de

1 fois par jour

Par voie intra-veineuse

Matin Midi Soir

Pendant jours

Jusqu'au/...../.....

INFORMATIONS PRATIQUES

Les flacons doivent être conservés au réfrigérateur entre 2°C et 8°C

Réservé à **l'hôpital ou en hospitalisation à domicile (HAD)**.

Pendant la durée de votre traitement, **signaler** la prise de ce traitement à tout professionnel de santé que vous consultez.

Ne pas arrêter la prise de ce médicament **avant la date de fin** prescrite par votre médecin.

En cas d'arrêt prématuré du médicament, risque : de reprise de l'infection, d'aggravation de l'état de santé, d'augmentation des résistances de la bactérie.

EFFETS INDÉSIRABLES

Digestifs : Diarrhées, vomissements, nausées

Cutanés : Eruptions cutanées

Musculaires : douleur, sensibilité, faiblesse musculaire

Biologiques : Perturbations au niveau du foie, du rein et du sang : élévation d'une enzyme musculaire (CPK)

Neurologiques : vertiges, maux de têtes

Pulmonaires : pneumopathie

Liste non exhaustive

PRÉCAUTIONS GÉNÉRALES

Avis médical :

- **Crampes inexpliquées, douleurs musculaires**
- Toux, fièvre, essoufflement
- Engourdissement, picotements, sensation de brûlure dans les mains ou pieds

Surveillance CPK et de la **fonction rénale** une fois par semaine

Interactions possibles avec réactifs de laboratoire : **prévenir biologiste**

PRÉCAUTIONS DU SITE D'INJECTION

Rougeur, chaleur, gonflement, sensibilité, douleur, présence pus ou écoulement

↓
Contacter votre infirmier

