

CLINDAMYCINE

DALACINE® 75mg, 150 mg, 300 mg, 600mg gélule

Ce médicament est un **antibiotique**

Il ne doit pas être interrompu sans avis médical

INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES



Si vous prenez les médicaments suivants,

Antiacides contenant magnésium, aluminium, calcium	MAALOX® PHOSPHALUGEL® ROCGEL® KEAL®	Laisser un intervalle de 2h entre ces médicaments et la Dalacine®
Pansements gastriques	GAVISCON® CARBOLEVURE® SMECTA®	
Résine chélatrice des sels biliaires	Cholestyramine QUESTRAN®	
Ciclosporine	NEORAL® SANDIMMUN® Voie intra-veineuse	Dosage plasmatique pendant le traitement et à l'arrêt du traitement
Tacrolimus	ADOPORT® ADVAGRAF® ENVARUS® MODIGRAF® PROGRAF®	
Anti-Vitamines K (AVK) Fluindione Warfarine Acénocoumarol	PREVISCAN® COUMADINE® SINTROM®	Réaliser des INR plus fréquemment

Liste non exhaustive

VOTRE POSOLOGIE

..... gélule(s) à 300 mg
..... fois par jour **au cours ou en dehors d'un repas**

Matin Midi Soir

Pendant jours
Jusqu'au/...../.....

EN CAS D'OUBLI

Si vous avez oublié de prendre une dose, prenez la suivante à l'heure habituelle.

Ne pas doubler la dose suivante pour compenser la dose oubliée



EN CAS DE VOMISSEMENTS

Si vomissements jusqu'à **1 heure** après la prise :
➡ reprendre l'antibiotique

Si vomissements plus de **1 heure** après la prise :
➡ ne pas reprendre l'antibiotique

Pendant la durée de votre traitement, **signaler** la prise de ce traitement à tout professionnel de santé que vous consultez.

Ne pas arrêter la prise de ce médicament **avant la date de fin** prescrite par votre médecin.

En cas d'arrêt prématuré du médicament, risque : de reprise de l'infection, d'aggravation de l'état de santé, d'augmentation des résistances de la bactérie.

EFFETS INDÉSIRABLES

Digestifs : Diarrhées, douleurs abdominales, **goût métallique ou amer dans la bouche**

Cutanés : Eruptions cutanées, urticaires, démangeaisons, **Mycoses**

Biologiques : Troubles du bilan hépatique (au niveau du foie) et du bilan sanguin

Liste non exhaustive

PRÉCAUTIONS

En cas de diarrhées pendant ou après le traitement surtout si elles sont sévères, persistantes ou avec du sang ou de glaires

- Prévenir votre médecin traitant
- Ne pas prendre de médicaments qui bloquent le transit intestinal (ex : loperamide IMODIUM®)

INFORMATIONS PRATIQUES

Conserver dans un endroit sec à température ambiante ne dépassant pas 30°C, hors de la vue et de la portée des enfants

Ne pas ouvrir les gélules
Ne pas croquer, ne pas écraser
Avaler avec un grand verre d'eau

Délivré **dans votre pharmacie** avec l'ordonnance de l'hôpital

NOTES

Pour toutes questions supplémentaires :

Site du centre de référence Nord- Ouest pour le traitement des infections ostéo-articulaires complexe : <http://www.crioac.org/>
n° vert : 0805 400 910

Téléphone du service d'hospitalisation :
03.20.44.64.53



Processus de Pharmacie Clinique

Document destiné aux patients de chirurgie orthopédie – traumatologie

Clindamycine DALACINE®

Gélule 75mg, 150 mg, 300 mg, 600mg

Nom :

Prénom :

Date de naissance :/...../.....

Document remis le :/...../.....

Par (fonction):

.....