

DOXYCYCLINE

DOXYCYCLINE® DOXY® DOXYLIS® 100 mg comprimé, TOLEXINE GE® 100 mg microgranules en comprimé

Ce médicament est un **antibiotique**

Il ne doit pas être interrompu sans avis médical

INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES



Si vous prenez les médicaments suivants,

Calcium	CACIT® OROCAL®	Laisser un intervalle de 2h entre ces médicaments et la Doxycycline
Fer	TARDYFERON® TIMOFEROL® INOFER®	
Zinc	EFFIZINC® RUBOZINC®	
Antiacides contenant magnésium, aluminium, calcium	MAALOX® PHOSPHALUGEL® ROCGEL® KEAL®	
Pansements gastriques	GAVISCON® CARBOLEVURE® SMECTA®	
Anti-Vitamines K (AVK) Fluidione Warfarine Acénocoumarol	PREVISCAN® COUMADINE® SINTROM®	Réaliser des INR plus fréquemment
Anti-épileptiques	Carbamazépine TEGRETOL® Phénytoïne DI-HYDAN®	Diminution efficacité de la Doxycycline

Liste non exhaustive

VOTRE POSOLOGIE

..... comprimé(s) à mg
.... fois par jour, **au cours d'un repas avec un grand verre d'eau**

Position assise ou debout

Matin Midi Soir

Pendant jours

Jusqu'au/...../.....

EN CAS D'OUBLI

Si vous avez oublié de prendre une dose, prenez la suivante à l'heure habituelle.

Ne pas doubler la dose suivante pour compenser la dose oubliée



EN CAS DE VOMISSEMENTS

Si vomissements jusqu'à **1 heure** après la prise :

➡ reprendre l'antibiotique

Si vomissements plus de **1 heure** après la prise : ne pas reprendre l'antibiotique



Pendant la durée de votre traitement, **signaler** la prise de ce traitement à tout professionnel de santé que vous consultez.

Ne pas arrêter la prise de ce médicament **avant la date de fin** prescrite par votre médecin.

En cas d'arrêt prématuré du médicament, risque : de reprise de l'infection, d'aggravation de l'état de santé, d'augmentation des résistances de la bactérie

EFFETS INDÉSIRABLES

Digestifs : diarrhées, nausées, vomissements, douleurs, perte appétit

Neurologiques : maux de tête, troubles de la vision, somnolence

Cutanés : éruptions cutanées, urticaires, démangeaisons, photosensibilisation

Biologiques : perturbation au niveau du foie et du bilan sanguin

PRÉCAUTIONS

Eviter l'exposition au soleil pendant le traitement et les 10 jours suivant l'arrêt.

En cas d'exposition directe: Se couvrir (chapeaux, vêtements longs), crème solaire indice IP50+



Bien respecter les conditions d'administration : au cours d'un repas avec grand verre d'eau et position debout ou assise (ne pas se coucher dans l'heure qui suit l'administration) pour éviter **brûlures et douleurs œsophages**



Maux de têtes, étourdissements
Trouble de la vision
Vomissements

Avis médical

INFORMATIONS PRATIQUES

Conserver dans un endroit sec à température ambiante, hors de la vue et de la portée des enfants

Doxycycline® Doxylis® : Les comprimés peuvent être coupés en deux

Doxy® : Ne pas couper le comprimé

TolexineGé® : Les comprimés peuvent être dissous dans un verre d'eau, bien agiter : couleur **jaune**.

Ne pas croquer, ne pas écraser

Délivré **dans votre pharmacie** sur présentation de l'ordonnance de l'hôpital ou de votre médecin traitant

NOTES

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Pour toutes questions supplémentaires :

Site du centre de référence Nord- Ouest pour le traitement des infections ostéo-articulaires complexe : <http://www.crioac.org/>
n° vert : 0805 400 910

Téléphone du service d'hospitalisation :
03.20.44.64.53



Processus de Pharmacie Clinique

Document destiné aux patients de chirurgie orthopédie – traumatologie

Doxycycline
DOXYCYCLINE® DOXY®
DOXYLIS® TOLEXINE GE®
Comprimé 100 mg

Nom :

Prénom :

Date de naissance :/...../.....

Document remis le :/...../.....

Par (fonction):

.....