

CEFTAZIDIME

CEFTAZIDIME® FORTUM® Flacon 250mg, 500mg, 1g, 2g Voie Intraveineuse

Ce médicament est un **antibiotique**

Il ne doit pas être interrompu sans avis médical

INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES



Si vous prenez les médicaments suivants,

Anti-vitamines K (AVK)

Fluindione
Warfarine
Acénocoumarol

PREVISCAN®
COUMADINE®
SINTROM®

Réaliser des INR plus fréquemment

Furosémide

LASILIX®

Augmentation de la toxicité rénale : surveillance

Liste non exhaustive

INFORMATIONS PRATIQUES

Les flacons doivent être conservés dans un endroit sec à température ambiante (moins de 25°C)

Délivré dans **votre pharmacie de ville** sur présentation de **l'ordonnance de l'hôpital**.

VOTRE POSOLOGIE

Une injection à g

.... fois par jour

Ou en continue

Par voie intra-veineuse

Matin Midi Soir

Pendant jours

Jusqu'au/...../.....

Pendant la durée de votre traitement, **signaler** la prise de ce traitement à tout professionnel de santé que vous consultez.

Ne pas arrêter la prise de ce médicament **avant la date de fin** prescrite par votre médecin.

En cas d'arrêt prématuré du médicament, risque : de reprise de l'infection, d'aggravation de l'état de santé, d'augmentation des résistances de la bactérie.

EFFETS INDÉSIRABLES

Neurologiques : Maux de têtes, vertiges

Digestifs : Diarrhées, colites

Cutanés : Eruptions cutanées, prurit

Biologiques : Perturbation au niveau du foie, du rein, du sang

Vasculaires : Inflammation d'une veine avec possibilité de formation d'un caillot qui la bouche (phlébite)

Liste non exhaustive

PRÉCAUTIONS GÉNÉRALES

Surveillance de la fonction rénale

Attention à la conduite



Avis médical :

- Diarrhées sévères, persistantes
- Suspicion de phlébites

PRÉCAUTIONS SITE D'INJECTION

Rougeur, chaleur, gonflement, sensibilité, douleur, présence pus ou écoulement

↓
Contacter votre infirmier

NOTES

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Pour toutes questions supplémentaires :

Site du centre de référence Nord- Ouest pour le traitement des infections ostéo-articulaires complexe : <http://www.crioac.org/>
 n° vert : 0805 400 910

Téléphone du service d’hospitalisation :
 03.20.44.64.53



Processus de Pharmacie Clinique

Document destiné aux patients de chirurgie orthopédie – traumatologie

Ceftazidime
CEFTAZIDIME® FORTUM®
Voie Intraveineuse

Flacon 250mg / 500mg / 1g / 2g

Nom :

Prénom :

Date de naissance :/...../.....

Document remis le :/...../.....

Par (fonction):

.....

