

FOSFOMYCINE

FOSFOCINE® Flacon 1 g ,4 g Voie intraveineuse

Ce médicament est un **antibiotique**

Il ne doit pas être interrompu sans avis médical

INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES



Si vous prenez les médicaments suivants,

Anti-Vitamines K (AVK)

Fluindione
Warfarine
Acénocoumarol

PREVISCAN®
COUMADINE®
SINTROM®

Réaliser des INR plus fréquemment

Liste non exhaustive

VOTRE POSOLOGIE

1 injection de g
toutes les heures
soitfois par jour

Par voie intra-veineuse

Matin Midi Soir

Pendant jours

Jusqu'au/...../.....

Pendant la durée de votre traitement, **signaler** la prise de ce traitement à tout professionnel de santé que vous consultez.

Ne pas arrêter la prise de ce médicament **avant la date de fin** prescrite par votre médecin.

En cas d'arrêt prématuré du médicament, risque : de reprise de l'infection, d'aggravation de l'état de santé, d'augmentation des résistances de la bactérie.

EFFETS INDÉSIRABLES

Digestifs : Diarrhées, vomissements, nausées

Cutanés : Eruptions cutanées

Biologiques : perturbation au niveau du sang (diminution des globules blancs) et du foie (élévation des enzymes)

Liste non exhaustive

PRÉCAUTIONS GÉNÉRALES

Signes d'allergie :
éruption cutanée, fièvre,
gonflement

Diarrhées sévères, persistantes

Contient du sodium : risque
d'œdème pulmonaire et
des membres inférieurs

Risque diminution du taux de potassium
(surtout si traitement prolongé) surveillance
par dosage sanguin du potassium

**Avis
médical**

PRÉCAUTIONS SITE D'INJECTION

Rougeur, chaleur, gonflement, sensibilité,
douleur, présence pus ou écoulement

↓
Contacter votre infirmier

INFORMATIONS PRATIQUES

Les flacons doivent être conservés à une température ne dépassant pas 25°C

Réservé à l'hôpital ou en hospitalisation à domicile (HAD)

