

ACIDE FUSIDIQUE

FUCIDINE® 250 mg comprimé

Ce médicament est un **antibiotique**

Il ne doit pas être interrompu sans avis médical

INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES



Si vous prenez les médicaments suivants,

Pansements gastriques	GAVISCON® CARBOLEVURE® SMECTA®	Intervalle d'au moins 2 heures
Médicaments diminuant le taux de cholestérol	Pravastatine ELISOR® VASTEN® Simvastatine ZOCOR®	Ne pas associer pendant le traitement et 7 jours après.
Les statines	Fluvastatine LESCOL® Atorvastatine TAHOR® Rosuvastatine CRESTOR®	Augmentation de l'effet des statines et donc de leurs effets indésirables.
Phytothérapie	Levure rouge de riz (contient de la lovastatine)	
Ciclosporine	NEORAL® SANDIMMUN® Voie intra-veineuse	Augmentation des concentrations de ciclosporine, risque de perturbation de la fonction rénale
Anti-Vitamines K (AVK)	PREVISCAN® COUMADINE® SINTROM®	Réaliser des INR plus fréquemment

Liste non exhaustive

VOTRE POSOLOGIE

..... comprimé(s) à mg
.... fois par jour **au cours d'un repas**
 Matin Midi Soir
Pendant jours
Jusqu'au/...../.....

EN CAS D'OUBLI

Si vous avez oublié de prendre une dose, prenez la suivante à l'heure habituelle.

Ne pas doubler la dose suivante pour compenser la dose oubliée



EN CAS DE VOMISSEMENTS

Si vomissements jusqu'à **2 heures** après la prise :
➡ reprendre l'antibiotique

Si vomissements plus de **2 heures** après la prise :
➡ ne pas reprendre l'antibiotique

Pendant la durée de votre traitement, **signaler** la prise de ce traitement à tout professionnel de santé que vous consultez.

Ne pas arrêter la prise de ce médicament **avant la date de fin** prescrite par votre médecin.

En cas d'arrêt prématuré du médicament, risque : de reprise de l'infection, d'aggravation de l'état de santé, d'augmentation des résistances de la bactérie

EFFETS INDÉSIRABLES

Digestifs : diarrhées, nausées, vomissements

Biologiques : perturbation au niveau du foie du rein et du bilan sanguin

Cutanés : éruptions cutanées, urticaires, démangeaisons

Neurologiques : maux de tête, somnolence

PRÉCAUTIONS

Douleur et faiblesse musculaire

Eruption cutanée, fièvre, cloques sur la peau, plaie dans la bouche

Jaunisse, urine foncée, selles pâles, nausées, vomissements, perte d'appétit

Avis
médical

INFORMATIONS PRATIQUES

Conserver dans un endroit sec à température ambiante, hors de la vue et de la portée des enfants.

Ne pas couper, Ne pas croquer, ne pas écraser
Avaler avec un grand verre d'eau

Délivré **dans votre pharmacie** sur présentation de l'ordonnance de l'hôpital ou de votre médecin traitant

NOTES

Pour toutes questions supplémentaires :

Site du centre de référence Nord- Ouest pour le traitement des infections ostéo-articulaires complexe : <http://www.crioac.org/>
n° vert : 0805 400 910

Téléphone du service d'hospitalisation :
03.20.44.64.53



Processus de Pharmacie Clinique

Document destiné aux patients de chirurgie orthopédie – traumatologie

Acide fusidique FUCIDINE®

Comprimé 250 mg

Nom :

Prénom :

Date de naissance :/...../.....

Document remis le :/...../.....

Par (fonction):

.....