

ACIDE FUSIDIQUE

FUCIDINE® 250mg/5ml suspension buvable 90ml,

Ce médicament est un **antibiotique**

Il ne doit pas être interrompu sans avis médical

INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES



Si vous prenez les médicaments suivants,

Médicaments diminuant le taux de cholestérol

Pravastatine
ELISOR®
VASTEN®

Ne pas associer pendant le traitement et 7 jours après.

Les statines

Simvastatine
ZOCOR®

Fluvastatine
LESCOL®

Atorvastatine
TAHOR®

Rosuvastatine
CRESTOR®

Augmentation de l'effet des statines et donc de leurs effets indésirables.

Ciclosporine

NEORAL®

SANDIMMUN®
Voie intra-veineuse

Augmentation des concentrations de ciclosporine, risque de perturbation de la fonction rénale

Anti-Vitamines K (AVK)

PREVISCAN®
COUMADINE®
SINTROM®

Réaliser des INR plus fréquemment

Fluindione
Warfarine
Acénocoumarol

Liste non exhaustive

VOTRE POSOLOGIE

..... cuillère(s)-mesure de 5ml (soit mg)

.... fois par jour **au cours d'un repas**

Matin Midi Soir

Pendant jours

Jusqu'au/...../.....

EN CAS D'OUBLI

Si vous avez oublié de prendre une dose, prenez la suivante à l'heure habituelle.

Ne pas doubler la dose suivante pour compenser la dose oubliée



EN CAS DE VOMISSEMENTS

Si vomissements jusqu'à **2 heures** après la prise :
➡ reprendre l'antibiotique

Si vomissements plus de **2 heures** après la prise :
➡ ne pas reprendre l'antibiotique

Pendant la durée de votre traitement, **signaler** la prise de ce traitement à tout professionnel de santé que vous consultez.

Ne pas arrêter la prise de ce médicament **avant la date de fin** prescrite par votre médecin.

En cas d'arrêt prématuré du médicament, risque : reprise de l'infection, aggravation de l'état de santé, augmentation des résistances de la bactérie

EFFETS INDÉSIRABLES

Digestifs : diarrhées, nausées, vomissements

Biologiques : perturbation au niveau du foie du rein et du bilan sanguin

Cutanés : éruptions cutanées, urticaires, démangeaisons

Neurologiques : maux de tête, somnolence

Liste non exhaustive

PRÉCAUTIONS

Douleur et faiblesse musculaire

Eruption cutanée, fièvre, cloques sur la peau, plaie dans la bouche

Jaunisse, urine foncée, selles pâles, nausées, vomissements, perte d'appétit

Avis médical

Bien agiter le flacon avant chaque utilisation.

L'utilisation de la cuillère-mesure est indispensable pour prélever une quantité précise



INFORMATIONS PRATIQUES

Conserver dans un endroit sec à température ambiante, hors de la vue et de la portée des enfants.

Délivré **dans votre pharmacie** sur présentation de l'ordonnance de l'hôpital ou de votre médecin traitant

NOTES

Pour toutes questions supplémentaires :

Site du centre de référence Nord- Ouest pour le traitement des infections ostéo-articulaires complexe : <http://www.crioac.org/>
n° vert : 0805 400 910

Téléphone du service d'hospitalisation :
03.20.44.64.53



Processus de Pharmacie Clinique

Document destiné aux patients de chirurgie orthopédie – traumatologie

Acide fusidique FUCIDINE®

250MG/5ML
Suspension buvable 90ML

Nom :

Prénom :

Date de naissance :/...../.....

Document remis le :/...../.....

Par :

Fonction :