

CEFALEXINE

KEFORAL® 500mg ou 1g comprimé, 250mg/5ml poudre pour suspension buvable

Ce médicament est un **antibiotique**

Il ne doit pas être interrompu sans avis médical

INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES



Si vous prenez ces médicaments,

Antivitamines K (AVK)

Fluindione
Warfarine
Acénocoumarol

COUMADINE®
PREVISCAN®
SINTROM®

Réaliser des INR plus fréquemment

Liste non exhaustive

INTERACTIONS ALIMENTAIRES



Avec les produits laitiers



Ne pas administrer en même temps que le lait et prise en dehors des repas

VOTRE POSOLOGIE

..... comprimé(s) à mg
.... fois par jour **en dehors d'un repas**
 Matin Midi Soir
Pendant jours
Jusqu'au/...../.....

EN CAS D'OUBLI

Si vous avez oublié de prendre une dose, prenez la suivante à l'heure habituelle.

Ne pas doubler la dose suivante pour compenser la dose oubliée



EN CAS DE VOMISSEMENTS

Si vomissements jusqu'à **1 heure** après la prise :
➔ reprendre l'antibiotique
Si vomissements plus de **1 heure** après la prise :
➔ ne pas reprendre l'antibiotique

Pendant la durée de votre traitement, **signaler** la prise de ce traitement à tout professionnel de santé que vous consultez.

Ne pas arrêter la prise de ce médicament **avant la date de fin** prescrite par votre médecin.

En cas d'arrêt prématuré du médicament, risque : de reprise de l'infection, d'aggravation de l'état de santé, d'augmentation des résistances de la bactérie

EFFETS INDÉSIRABLES

Digestifs : diarrhées, nausées, vomissements

Manifestations allergiques : fièvre, éruptions cutanées, urticaires, démangeaisons

Biologiques : perturbation au niveau du foie du rein et du bilan sanguin

Neurologiques : confusion, troubles de la conscience, convulsions (surtout en cas de surdosage, ou de perturbation de la fonction rénale)

Liste non exhaustive

PRÉCAUTIONS



Attention à la conduite

Si **manifestation allergiques** (rougeurs cutanées, démangeaisons...) en cours de traitement

Si **diarrhées** sévères, surtout si présence de sang ou mucus en cours ou après arrêt de traitement



Avis médical

INFORMATIONS PRATIQUES

Conserver dans un endroit sec à température ambiante, hors de la vue et de la portée des enfants

Les comprimés ne doivent pas être coupés
Ne pas croquer / Ne pas écraser

Délivré dans **votre pharmacie** sur présentation de l'ordonnance de l'hôpital ou de votre médecin traitant

NOTES

Pour toutes questions supplémentaires :

Site du centre de référence Nord- Ouest pour le traitement des infections ostéo-articulaires complexe : <http://www.crioac.org/>
n° vert : 0805 400 910

Téléphone du service d'hospitalisation :
03.20.44.64.53



Processus de Pharmacie Clinique

Document destiné aux patients de chirurgie orthopédie – traumatologie

CéfalexineKEFORAL®

Comprimé 500mg ou 1g
Suspension buvable 250mg/5ml

Nom :

Prénom :

Date de naissance :/...../.....

Document remis le :/...../.....

Par (fonction):

.....