

MINOCYCLINE


MYNOCINE® MINOCYCLINE® 100mg gélule ou comprimé

Ce médicament est un **antibiotique**

Il ne doit pas être interrompu sans avis médical

INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

Si vous prenez les médicaments suivants,

 Calcium	CACIT® OROCAL® JUVAMINE VIT D et Ca ®	Laisser un intervalle de 2h entre ces médicaments et la minocycline (Mynocine®)
Zinc	ZINC JUVAMINE® EFFIZINC® RUBOZINC®	
Fer	TARDYFERON® TIMOFEROL® INOFER®	
Antiacides contenant du magnésium ou de l'aluminium	MAALOX® PHOSPHALUGEL® ROCGEL® KEAL®	
Pansements digestifs	GAVISCON® CARBOLEVURE® SMECTA®	
Anti-Vitamines K (AVK)		
Fluindione Warfarine Acénocoumarol	PREVISCAN® COUMADINE® SINTROM®	Réaliser des INR plus fréquemment

Liste non exhaustive

VOTRE POSOLOGIE

..... gélule(s)/comprimé(s) à 100 mg
.... fois par jour **au cours d'un repas**
 Matin Midi Soir
Pendant jours
Jusqu'au/...../.....

EN CAS D'OUBLI

Si vous avez oublié de prendre une dose, prenez la suivante à l'heure habituelle.

Ne pas doubler la dose suivante pour compenser la dose oubliée



EN CAS DE VOMISSEMENTS

Si vomissements jusqu'à **2 heures** après la prise :
➔ reprendre l'antibiotique

Si vomissements plus de **2 heures** après la prise :
➔ ne pas reprendre l'antibiotique

Pendant la durée de votre traitement, **signaler** la prise de ce traitement à tout professionnel de santé que vous consultez.

Ne pas arrêter la prise de ce médicament **avant la date de fin** prescrite par votre médecin.

En cas d'arrêt prématuré du médicament, **risque** : de reprise de l'infection, d'aggravation de l'état de santé, d'augmentation des résistances de la bactérie.

EFFETS INDÉSIRABLES

Digestifs : Diarrhées, douleurs abdominales

Cutanés : Eruptions cutanées, urticaires, démangeaisons

Biologiques : Perturbation au niveau du foie, du rein et du bilan sanguin.

Neurologiques : Etourdissements, vertiges, maux de tête, troubles de la vision augmentation de la pression à l'intérieur du crâne, altération de l'audition (sifflements, bourdonnements)

Respiratoires : Toux, difficulté à respirer

Liste non exhaustive

PRÉCAUTIONS

Éviter l'exposition au soleil

pendant le traitement et les 10 jours suivant l'arrêt

En cas d'exposition: Se couvrir (chapeaux, vêtements longs), crème solaire indice IP50+



Coloration brune-bleu des zones photoexposées ou sur les cicatrices : Régressive à l'arrêt du traitement

Fièvre, éruptions cutanées

Trouble la vision, maux de tête

Avis
médical

Attention à la conduite



INFORMATIONS PRATIQUES

Conserver dans un endroit sec à température ambiante ne dépassant pas 30°C, hors de la vue et de la portée des enfants

Ne pas ouvrir les gélules

Ne pas croquer, ne pas écraser

Avaler avec un grand verre d'eau

Délivré **dans votre pharmacie** sur présentation de l'ordonnance de l'hôpital ou de votre médecin traitant

NOTES

Pour toutes questions supplémentaires :

Site du centre de référence Nord- Ouest pour le traitement des infections ostéo-articulaires

complexe : <http://www.crioac.org/>

n° vert : 0805 400 910

Téléphone du service d'hospitalisation :

03.20.44.64.53



Processus de Pharmacie Clinique

Document destiné aux patients de chirurgie orthopédie – traumatologie

Minocycline
MINOCYCLINE® MYNOCINE®

Comprimé ou Gélule 100mg

Nom :

Prénom :

Date de naissance :/...../.....

Document remis le :/...../.....

Par (fonction):

.....