

# RIFAMPICINE

RIFADINE® RIMACTAN® 300 mg gélule,

Ce médicament est un **antibiotique**

**Il ne doit pas être interrompu sans avis médical**

## INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES



La rifampicine interagit avec de nombreux médicaments jusqu'à un mois après son arrêt.

<b>Contraceptifs Oraux : Pilules Oestroprogestatives</b>	Diminution de l'efficacité
<b>Anti-vitamines K (AVK) Warfarine COUMADINE® Fluindione PREVISCAN® Acénocoumarol SINTROM®</b>	Diminution de l'efficacité Réaliser des INR plus fréquemment
<b>Anticoagulants oraux Dabigatran PRADAXA® Rivaroxaban XARELTO® Apixaban ELIQUIS®</b>	Diminution de l'efficacité
<b>Hormones thyroïdiennes LEVOTHYROX® L-THYROXINE®</b>	Diminution de l'efficacité. Surveillance biologique des hormones thyroïdiennes plus fréquente
<b>Antidépresseurs Sertraline ZOLOFT® Miansérine</b>	Diminution de l'efficacité de ces médicaments
<b>Antiépileptiques Acide valproïque DEPAKINE® Carbamazépine TEGRETOL®</b>	Risque de survenue de crises convulsives Surveillance clinique et biologique pendant le traitement et à l'arrêt
<b>Immunosuppresseurs Ciclosporine NEORAL® Tacrolimus PROGRAF®</b>	Dosage plasmatique pendant le traitement et à l'arrêt du traitement antibiotique



**Liste non exhaustive** : Avant toutes prises de nouveaux médicaments sur ordonnance, en vente libre, produits naturels (plantes...)

➔ Signaler la prise de rifampicine à votre médecin et pharmacien

## VOTRE POSOLOGIE

..... gélule(s) à ..... mg  
.... fois par jour, **à jeun et au moins 30 minutes avant un repas ou 2 heures après**

Matin                       Midi                       Soir

Pendant ..... jours

Jusqu'au ...../...../.....

## EN CAS D'OUBLI

Si vous avez oublié de prendre une dose, prenez la suivante à l'heure habituelle.

**Ne pas doubler** la dose suivante pour compenser la dose oubliée



## EN CAS DE VOMISSEMENTS

Si vomissements jusqu'à **2 heures** après la prise : reprendre l'antibiotique

Si vomissements plus de **2 heures** après la prise : ne pas reprendre l'antibiotique

Pendant la durée de votre traitement, signaler la prise de ce traitement à tout professionnel de santé que vous consultez.

**Ne pas arrêter** la prise de ce médicament **avant la date de fin** prescrite par votre médecin.

En cas d'arrêt prématuré du médicament, risque : de reprise de l'infection, d'aggravation de l'état de santé, d'augmentation des résistances de la bactérie

## EFFETS INDÉSIRABLES

**Liquides corporels** : sueur, salive, larmes, urine et selles : coloration en rouge ou brun orangé, sans danger et réversible à l'arrêt du traitement

**Digestifs** : diarrhées, nausées, vomissements

**Réactions allergiques** : syndrome pseudo-grippal, urticaires, éruptions cutanées, fièvre

**Biologiques** : perturbation au niveau du foie du rein et du bilan sanguin

## PRÉCAUTIONS

**Coloration orangée des liquides corporels : Eviter le port de lentilles de contact** (coloration irréversible)



**Avis médical :**

- Si apparition de « bleus » ou **petites taches rouges sur la peau**, saignements inexplicables
- Essoufflement, fatigue, perte d'appétit
- Jaunisse, selles pâles

Efficacité de la **pilule oestro-progestative** peut être diminuée (risque de grossesse) => Utilisation d'un **autre moyen contraceptif mécanique (préservatif)** pendant le traitement et jusqu'à **un mois** après l'arrêt

## INFORMATIONS PRATIQUES

**Conserver** dans un endroit sec à température ambiante, hors de la vue et de la portée des enfants

**Ne pas ouvrir la gélule**

Délivré **dans votre pharmacie** sur présentation de l'ordonnance de l'hôpital ou de votre médecin traitant

## NOTES

Pour toutes questions supplémentaires :

Site du centre de référence Nord- Ouest pour le traitement des infections ostéo-articulaires complexe : <http://www.crioac.org/>  
n° vert : 0805 400 910

Téléphone du service d'hospitalisation :  
03.20.44.64.53



*Processus de Pharmacie Clinique*

Document destiné aux patients de chirurgie orthopédie – traumatologie

**Rifampicine**

**RIFADINE® RIMACTAN®**

Gélule 300 mg

Nom : .....

Prénom : .....

Date de naissance : ...../...../.....

Document remis le : ...../...../.....

Par (fonction): .....

.....