

# LEVOFLOXACINE

## LEVOFLOXACINE® TAVANIC® Flaçon 250 mg, 500 mg, Voie intraveineuse

Ce médicament est un **antibiotique**

**Il ne doit pas être interrompu sans avis médical**

### INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES



Si vous prenez les médicaments suivants,

<b>Ciméti</b>	CIMETIDINE®	Augmentation effets indésirables de la lévofloxacine surtout chez les insuffisants rénaux
<b>Ciclosporine</b>	NEORAL® SANDIMMUN® Voir intra-veineuse	Dosage plasmatique et surveillance fonction rénale pendant le traitement et à l'arrêt du traitement
<b>Anti-Vitamines K (AVK)</b>		
Fluindione Warfarine Acénocoumarol	PREVISCAN® COUMADINE® SINTROM®	Réaliser des INR plus fréquemment

*Liste non exhaustive*

### VOTRE POSOLOGIE

Une injection à .....

Toutes les ... heures

Soit .... fois par jour

Par voie intra-veineuse

Matin                       Midi                       Soir

Pendant ..... jours

### INFORMATIONS PRATIQUES

Les flacons doivent être conservés dans un endroit sec à température ambiante (moins de 25°C)

Réservé à **l'hôpital ou en hospitalisation à domicile (HAD)**.

### PRÉCAUTIONS SITE D'INJECTION

Rougeur, chaleur, gonflement, sensibilité, douleur, présence pus ou écoulement

Contactez votre infirmier

### EFFETS INDÉSIRABLES

**Douleurs musculaires, articulaires, tendinites** : (tendon d'Achille +++)

**Cutanés** : Eruptions cutanées, urticaires, démangeaisons, **photosensibilisation**, **mycoses**

**Neurologiques** : Maux de tête, vertiges, somnolence, insomnie, convulsions, troubles de la vision

**Digestifs** : Diarrhées, vomissements, nausées, douleurs abdominales

**Biologiques** : Perturbations au niveau foie, du rein, du bilan sanguin et du potassium

**Cardiaques** : Palpitations, hypotension

### PRÉCAUTIONS GÉNÉRALES

*Liste non exhaustive*  
Attention à la conduite



**Avis médical** :

- **Douleurs, inflammations tendons** (surtout au niveau du pied) pendant et jusqu'à plusieurs mois après l'arrêt
- Sensation battements du cœur irréguliers ou rapides
- Diarrhées sévères, persistantes

**Eviter l'exposition au soleil** pendant le traitement et les 2 jours suivant l'arrêt.

**En cas d'exposition**: Se couvrir (chapeaux, vêtements longs), crème solaire indice IP50+

