

# LEVOFLOXACINE


## LEVOFLOXACINE® TAVANIC® 500 mg comprimé

Ce médicament est un **antibiotique**

**Il ne doit pas être interrompu sans avis médical**

### INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

Si vous prenez les médicaments suivants,

 <b>Fé</b>	TARDYFERON® TIMOFEROL® INOFER®	Laisser un intervalle de 2h entre ces médicaments et la Lévofloxacine (Tavanic®)
<b>Zinc</b>	EFFIZINC® RUBOZINC®	
<b>Pansements digestifs</b>	GAVISCON® CARBOLEVURE® SMECTA®	
<b>Antiacides contenant du magnésium ou de l'aluminium</b>	MAALOX® PHOSPHALUGEL® ROCGEL® KEAL®	
<b>Cimétidine</b>	CIMETIDINE®	Augmentation effets indésirables de la lévofloxacine surtout chez les insuffisants rénaux
<b>Ciclosporine</b>	NEORAL®  SANDIMMUN® Voie intra-veineuse	Dosage plasmatique et surveillance fonction rénale pendant le traitement et à l'arrêt du traitement
<b>Anti-Vitamines K (AVK)</b>		Réaliser des INR plus fréquemment
<b>Fluindione Warfarine Acénocoumarol</b>	PREVISCAN® COUMADINE® SINTROM®	

Liste non exhaustive

### VOTRE POSOLOGIE

..... comprimé(s) à ..... mg  
 .... fois par jour **au cours ou en dehors d'un repas**

Matin                       Midi                       Soir

Pendant ..... jours  
 Jusqu'au ...../...../.....

### EN CAS D'OUBLI

Si vous avez oublié de prendre une dose, prenez la suivante à l'heure habituelle.

**Ne pas doubler** la dose suivante pour compenser la dose oubliée



### EN CAS DE VOMISSEMENTS

Si vomissements jusqu'à **1 heure** après la prise :  
 ➡ reprendre l'antibiotique

Si vomissements plus de **1 heure** après la prise :  
 ➡ ne pas reprendre l'antibiotique

Pendant la durée de votre traitement, **signaler** la prise de ce traitement à tout professionnel de santé que vous consultez.

**Ne pas arrêter** la prise de ce médicament **avant la date de fin** prescrite par votre médecin.

En cas d'arrêt prématuré du médicament, risque : de reprise de l'infection, d'aggravation de l'état de santé, d'augmentation des résistances de la bactérie.

### EFFETS INDÉSIRABLES

**Douleurs musculaires, articulaires, tendinites** : tendon d'Achille +++ mais tous les tendons peuvent être touchés

**Cutanés** : Eruptions cutanées, urticaires, démangeaisons, **photosensibilisation**

**Neurologiques** : Maux de tête, vertiges, somnolence, insomnie, convulsions, troubles de la vision

**Digestifs** : Diarrhées, vomissements, nausées

**Biologiques** : Perturbation au niveau foie, du rein, du bilan sanguin et du potassium

**Cardiaques** : Palpitations

Liste non exhaustive

### PRÉCAUTIONS

**Goût métallique dans la bouche** : Prise pendant repas ou collation

**Douleurs, inflammations tendons** (surtout au niveau du pied) pendant et jusqu'à plusieurs mois après l'arrêt

Sensation battements du cœur irréguliers ou rapides

**Avis médical**

**Eviter l'exposition au soleil** pendant le traitement et les 2 jours suivant l'arrêt.

**En cas d'exposition** : Se couvrir (chapeaux, vêtements longs), crème solaire indice IP50+



**Diabétique**, risque d'hypoglycémie ou d'hyperglycémie : Surveiller fréquemment la glycémie

**Attention à la conduite** (somnolence)



## INFORMATIONS PRATIQUES

Conserver dans un endroit sec à température ambiante, hors de la vue et de la portée des enfants

Les comprimés peuvent être divisés en deux  
Ne pas croquer, ne pas écraser

Délivré **dans votre pharmacie** sur présentation de l'ordonnance de l'hôpital ou de votre médecin traitant

## NOTES

Pour toutes questions supplémentaires :

Site du centre de référence Nord- Ouest pour le traitement des infections ostéo-articulaires complexe : <http://www.crioac.org/>  
n° vert : 0805 400 910

Téléphone du service d'hospitalisation :  
03.20.44.64.53



*Processus de Pharmacie Clinique*

Document destiné aux patients de chirurgie orthopédie – traumatologie

**Lévofloxacine**  
**LEVOFLOXACINE® TAVANIC®**

Comprimé 500mg

Nom : .....

Prénom : .....

Date de naissance : ...../...../.....

Document remis le : ...../...../.....

Par (fonction): .....

.....