

PIPERACILLINE TAZOBACTAM

PIPERACILLINE/TAZOBACTAM® TAZOCILLINE® 4g/0,5g ou 2g/0,25g Voie intraveineuse

Ce médicament est un **antibiotique**

Il ne doit pas être interrompu sans avis médical

INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES



Si vous prenez les médicaments suivants,

Anti-Vitamines K (AVK)

Fluindione
Warfarine
Acénocoumarol

PREVISCAN®
COUMADINE®
SINTROM®

Réaliser des INR plus fréquemment

Méthotrexate

NOVATREX®
IMETH®
METOJECT®

Mauvaise élimination du Méthotrexate : risque d'augmentation des effets indésirables

Liste non exhaustive

VOTRE POSOLOGIE

1 injection de
toutes les heures
soitfois par jour
Par voie intraveineuse

Matin Midi Soir

Pendant jours
Jusqu'au/...../.....

Pendant la durée de votre traitement, signaler la prise de ce traitement à tout professionnel de santé que vous consultez.

Ne pas arrêter la prise de ce médicament **avant la date de fin** prescrite par votre médecin.

En cas d'arrêt prématuré du médicament, risque : de reprise de l'infection, d'aggravation de l'état de santé, d'augmentation des résistances de la bactérie.

EFFETS INDÉSIRABLES

Digestifs : Diarrhées, vomissements, nausées

Cutanés : Eruptions cutanées, **mycoses**

Biologiques : perturbation au niveau du foie, et sang (anémie, diminution des plaquettes et du taux de potassium)

Neurologiques : insomnies, maux de tête

Liste non exhaustive

PRÉCAUTIONS GÉNÉRALES

Signes d'allergie :
éruption cutanée, fièvre,
gonflement

Diarrhées sévères, persistantes
Pâleur, fatigue (signes d'anémie)

Saignements, bleus inexplicables
(signes de diminution des
plaquettes dans le sang)

**Avis
médical**

Interactions possibles avec réactifs de laboratoire : prévenir biologiste

PRÉCAUTIONS SITE D'INJECTION

Rougeur, chaleur, gonflement, sensibilité,
douleur, présence pus ou écoulement

↓
Contacter votre infirmier

INFORMATIONS PRATIQUES

Les flacons doivent être conservés au réfrigérateur entre 2°C et 8°C

Délivré dans **votre pharmacie de ville** sur présentation de **l'ordonnance de l'hôpital**.

