

IMIPENEM / CILASTATINE

IMIPENEM/CILASTATINE® TIENAM® 250 mg/250 mg, 500 mg/500 mg Voie intraveineuse

Ce médicament est un **antibiotique**

Il ne doit pas être interrompu sans avis médical

INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES



Si vous prenez les médicaments suivants,

Anti-Vitamines K (AVK) Fluindione Warfarine Acénocoumarol	PREVISCAN® COUMADINE® SINTROM®	Réaliser des INR plus fréquemment
Ganciclovir	CYMEVAN®	Risque de crises convulsives
Acide valproïque	DEPAKINE® DEPAKINE CHRONO® MICROPAKINE® DEPAKOTE®	Diminution des concentrations de ces médicaments : risque de crises convulsives

Liste non exhaustive

VOTRE POSOLOGIE

1 injection de
toutes les heures
soitfois par jour
Par voie intra-veineuse

Perfusion d'au moins 30 minutes
Ne jamais faire d'intraveineuse directe

Matin Midi Soir

Pendant jours

INFORMATIONS PRATIQUES

Les flacons doivent être conservés dans un endroit sec à température ambiante (moins de 25°C)

Disponible dans votre pharmacie sur présentation de l'**ordonnance de l'hôpital**

Pendant la durée de votre traitement, **signaler** la prise de ce traitement à tout professionnel de santé que vous consultez.

Ne pas arrêter la prise de ce médicament **avant la date de fin** prescrite par votre médecin.

En cas d'arrêt prématuré du médicament, risque : de reprise de l'infection, d'aggravation de l'état de santé, d'augmentation des résistances de la bactérie.

EFFETS INDÉSIRABLES

Digestifs : Diarrhées, vomissements, nausées

Cutanés : Eruptions cutanées

Biologiques : perturbation au niveau du foie (élévation des enzymes), et sang -> surveillance régulière de la fonction du foie

Liste non exhaustive

PRÉCAUTIONS GÉNÉRALES

Signes d'allergie :
éruption cutanée, fièvre,
gonflement

Diarrhées sévères, persistantes

Tremblements, convulsions,
confusion

**Avis
médical**

Interactions possibles avec réactifs de laboratoire : prévenir biologiste

PRÉCAUTIONS SITE D'INJECTION

Rougeur, chaleur, gonflement, sensibilité,
douleur, présence pus ou écoulement

↓
Contacter votre infirmier

