

VANCOMYCINE

VANCOMYCINE® Flacon 125 mg, 250 mg, 500 mg, 1 g **Voie intraveineuse**

Ce médicament est un **antibiotique**

Il ne doit pas être interrompu sans avis médical

INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES



Si vous prenez les médicaments suivants,

Anti-vitamines K (AVK)

Fluindione
Warfarine
Acénocoumarol

PREVISCAN®
COUMADINE®
SINTROM®

Réaliser des INR plus fréquemment

Liste non exhaustive

INFORMATIONS PRATIQUES

Les flacons doivent être conservés dans un endroit sec à température ambiante (moins de 25°C)

Délivré **à la pharmacie de l'hôpital** sur présentation de **l'ordonnance de l'hôpital**.

VOTRE POSOLOGIE

Une injection de
Toutes les ... heures
Soit fois par jour
Ou en continue
Par voie intraveineuse

Matin Midi Soir

Pendant jours
Jusqu'au/...../.....

Pendant la durée de votre traitement, **signaler** la prise de ce traitement à tout professionnel de santé que vous consultez.

Ne pas arrêter la prise de ce médicament **avant la date de fin** prescrite par votre médecin ou pharmacien.

En cas d'arrêt prématuré du médicament, risque : de reprise de l'infection, d'aggravation de l'état de santé, d'augmentation des résistances de la bactérie.

EFFETS INDÉSIRABLES

Digestifs : Vomissements, nausées

Auditives : Troubles de l'audition

Cutanés : Eruptions et démangeaisons cutanées transitoires sur le visage, épaules, cou, dos
Irritation au niveau de la veine où la vancomycine a été injecté

Musculaires : Douleur pulsatile dans le cou et le dos

Biologiques : Perturbations au niveau du rein, du sang

Liste non exhaustive

PRÉCAUTIONS GÉNÉRALES

Réalisation de dosages pour surveiller le taux de médicament dans le sang.

Avis médical :

- Troubles d'audition
- Signes d'allergies : éruption cutanées, fièvre, gonflement
- Diarrhées sévères, persistantes
- Signes de phlébite (caillot dans la veine) au moment de l'injection



PRÉCAUTIONS SITE D'INJECTION

Rougeur, chaleur, gonflement, sensibilité, douleur, présence pus ou écoulement

↓
Contacter votre infirmier

