

LINEZOLIDE

LINEZOLIDE® ZYVOXID® 600 mg comprimé, 100mg/5ml Granulés pour suspension buvable

Ce médicament est un **antibiotique**

Il ne doit pas être interrompu sans avis médical

INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES



Si vous prenez les médicaments suivants,

Pansements gastriques	GAVISCON® CARBOLEVURE® CARBOSYLANE® SMECTA® POLYSILANE®
Triptans : SumatriptanImigrane® ZolmitriptanZomigoro® Médicaments contre le rhume contenant de la pseudoéphédrine (Actifed rhume® Humexrhume®...)	Risque de poussées d'hypertension artérielle
Dextrométhorphan e contenu dans certaines sirops contre la toux (Tussidane® , Drill®...) Antidépresseurs : fluoxetine , citalopram , escitalopram , sertraline , fluvoxamine , paroxetine , venlafaxine , minalcipran , duloxetine , iproniazide , moclobemide	Risque de syndrome sérotoninergique diarrhée, sueurs, tremblements, confusion, voire coma A éviter si possible
Hypericum perforatum Millepertuis Tramadol Topalgic®	
Warfarine Coumadine®	Réaliser des INR plus fréquemment

Liste non exhaustive

VOTRE POSOLOGIE

..... comprimé(s) à mg
.... fois par jour **au cours ou en dehors**
d'un repas

Matin Midi Soir

Pendant jours
Jusqu'au/...../.....

EN CAS D'OUBLI

Si vous avez oublié de prendre une dose,
prenez la suivante à l'heure habituelle.

Ne pas doubler la dose suivante pour comp
la dose oubliée



EN CAS DE VOMISSEMENTS

Si vomissements jusqu'à **2 heures** après la prise :
reprendre l'antibiotique

Si vomissements plus de **2 heures** après la prise :
ne pas reprendre l'antibiotique

Pendant la durée de votre traitement, **signaler** la
prise de ce traitement à tout professionnel de santé
que vous consultez.

Ne pas arrêter la prise de ce médicament **avant la**
date de fin prescrite par votre médecin.

En cas d'arrêt prématuré du médicament, risque: de
reprise de l'infection, d'aggravation de l'état de
santé, d'augmentation des résistances de la
bactérie.

EFFETS INDÉSIRABLES

Digestifs : Diarrhées, vomissements,
nausées, douleurs abdominales

Neurologiques : Insomnie, convulsions,
troubles de la vision, troubles cognitifs, maux
de tête, altération du goût (goût métallique),
perte de sensibilité (fourmillement ou
picotement)

Cutanés : Eruptions cutanées, urticaires,
démangeaisons, gonflement, **mycoses**

Biologiques : Troubles du bilan sanguin
(**anémie**), du foie et du rein

Hypertension artérielle

Liste non exhaustive

PRÉCAUTIONS

Limiter la consommation de **fromages**
fermentés, **alcool (bière pression et vin)**,
sauce soja : risque de crise hypertensive

Diarrhées, sueurs, confusions,
tremblements

Troubles de la vision

Fatigue, pâleur, frissons

Fourmillements des mains, pieds,
sensations de brûlure : arrêt immédiat et
consulter votre médecin

Attention à la conduite



Avis
médical

INFORMATIONS PRATIQUES

Conserver dans un endroit sec à température ambiante, hors de la vue et de la portée des enfants

Ne pas croquer, ne pas écraser

Délivré **dans lapharmacie à usage intérieur de l'hôpital** sur présentation de l'ordonnance de l'hôpital ou de votre médecin traitant

NOTES

Pour toutes questions supplémentaires :

Site du centre de référence Nord- Ouest pour le traitement des infections ostéo-articulaires complexe : <http://www.crioac.org/>
n° vert : 0805 400 910

Téléphone du service d'hospitalisation :
03.20.44.64.53



Processus de Pharmacie Clinique

Document destiné aux patients de chirurgie orthopédie – traumatologie

Linézolide
LINEZOLIDE® ZYVOXID®

Comprimé 600mg
Granulés pour suspension buvable
100mg/5ml

Nom :

Prénom :

Date de naissance :/...../.....

Document remis le :/...../.....

Par (fonction):

.....