

## FUNGIZONE® 10%,

Ce médicament est un antifongique

### INDICATION

Ce médicament est prescrit pour prévenir le risque de mycoses pouvant être favorisé par votre prise d'antibiotiques.

### VOTRE POSOLOGIE

..... cuillère(s) mesure

.... fois par jour **en dehors des repas**

Matin       Midi       Soir

Pendant ..... jours

Jusqu'au ...../...../.....

### EFFETS INDÉSIRABLES et PRÉCAUTIONS

Digestifs : diarrhées, nausées, vomissements

Jaunissement passager des dents, atténué avec le brossage

### EN CAS D'OUBLI



Si vous avez oublié de prendre une dose, prenez la suivante à l'heure habituelle.

**Ne pas doubler** la dose suivante pour compenser la dose oubliée

**FUNGIZONE® 10%,**  
Ce médicament est un **antifongique**

### INFORMATIONS PRATIQUES

Conserver dans un endroit sec à température ambiante, hors de la vue et de la portée des enfants.

Délivré **dans votre pharmacie** sur présentation de l'ordonnance de l'hôpital ou de votre médecin traitant

Pour toutes questions supplémentaires :

Site du centre de référence Nord- Ouest pour le traitement des infections ostéo-articulaires complexe : <http://www.crioac.org/>  
n° vert : 0805 400 910

Téléphone du service d'hospitalisation :  
03.20.44.64.53



***Processus de Pharmacie Clinique***

*Version d'avril 2018*