

# RIFADINE®

Rifampicine

*gélule 300 mg, suspension buvable*

## Posologie :

20 mg/kg/j en 2 prises (infections graves)

A JEUN (30 min avant ou 2h après le repas)

## Effets indésirables :

- ◆ Cutanés : prurit, urticaire
- ◆ Digestifs : nausées anorexie, douleurs abdominales
- ◆ Syndrome grippal, toux irritative
- ◆ Thrombopénie
- ◆ Troubles respiratoires asthmatiformes
- ◆ Insuffisance rénale aiguë



Coloration des urines, crachats, larmes ☒ CI : port de lentilles

## Interactions médicamenteuses : action inductrice enzymatique dès 600 mg/j

- ◆ AVK :  $\searrow$  INR ( $\nearrow$  brutale à l'arrêt de la Rifampicine)
- ◆ Antagonistes calciques, digitoxine
- ◆ Hormones thyroïdiennes, contraceptifs oraux
- ◆ Antifongiques : espacer les prises de 2h

## Précaution d'emploi :

- ◆ Surveillance régulière (tous les 15 jours) de la NFS plaquettes et du bilan hépatique : arrêt traitement si  $> 6N$
- ◆ Surveillance régulière du TP si traitement par AVK
- ◆ Jamais en monothérapie