

CEFOTAXIME

CEFOTAXIME® CLAFORAN® Flacon 500mg, 1g, 2g Voie intraveineuse

Ce médicament est un **antibiotique**

Il ne doit pas être interrompu sans avis médical

INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES



Si vous prenez les médicaments suivants,

Anti-vitamines K (AVK)

Fluidione
Warfarine
Acénocoumarol

PREVISCAN®
COUMADINE®
SINTROM®

Réaliser des INR plus fréquemment

Furosémide

LASILIX®

Augmentation de la toxicité rénale : surveillance

Liste non exhaustive

INFORMATIONS PRATIQUES

Les flacons doivent être conservés dans un endroit sec à température ambiante (moins de 25°C)

Délivré à la **pharmacie de l'hôpital** sur présentation de **l'ordonnance de l'hôpital**.

VOTRE POSOLOGIE

Une injection à mg
.... fois par jour

Par voie intra-veineuse

Matin Midi Soir

Pendant jours

Jusqu'au/...../.....

Pendant la durée de votre traitement, **signaler** la prise de ce traitement à tout professionnel de santé que vous consultez.

Ne pas arrêter la prise de ce médicament **avant la date de fin** prescrite par votre médecin.

En cas d'arrêt prématuré du médicament, risque : de reprise de l'infection, d'aggravation de l'état de santé, d'augmentation des résistances de la bactérie.

EFFETS INDÉSIRABLES

Neurologiques : Maux de têtes, troubles de la conscience, mouvements anormaux, vertiges

Digestifs : Diarrhées

Cutanés : Eruptions cutanées, urticaires

Biologiques : perturbation au niveau du foie, du rein, du sang

Liste non exhaustive

PRÉCAUTIONS GÉNÉRALES

Attention à la conduite



Avis médical :

- Signes d'allergies : éruptions cutanées, fièvre, gonflement
- Diarrhées sévères, persistantes

PRÉCAUTIONS SITE D'INJECTION

Rougeur, chaleur, gonflement, sensibilité, douleur, présence pus ou écoulement



Contactez votre infirmier

