

LEVOFLOXACINE

LEVOFLOXACINE® TAVANIC® Flacon 250 mg, 500 mg, Voie intraveineuse

Ce médicament est un **antibiotique**

Il ne doit pas être interrompu sans avis médical

INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES



Si vous prenez les médicaments suivants,

Cimétidine	CIMETIDINE®	Augmentation effets indésirables de la lévofloxacine surtout chez les insuffisants rénaux
Ciclosporine	NEORAL® SANDIMMUN® Voir intra-veineuse	Dosage plasmatique et surveillance fonction rénale pendant le traitement et à l'arrêt du traitement
Anti-Vitamines K (AVK)		
Fluindione Warfarine Acénocoumarol	PREVISCAN® COUMADINE® SINTROM®	Réaliser des INR plus fréquemment

Liste non exhaustive

VOTRE POSOLOGIE

Une injection à

Toutes les ... heures

Soit fois par jour

Par voie intra-veineuse

Matin Midi Soir

Pendant jours

INFORMATIONS PRATIQUES

Les flacons doivent être conservés dans un endroit sec à température ambiante (moins de 25°C)

Réservé à **l'hôpital ou en hospitalisation à domicile (HAD)**.

PRÉCAUTIONS SITE D'INJECTION

Rougeur, chaleur, gonflement, sensibilité, douleur, présence pus ou écoulement

↓
Contacter votre infirmier

EFFETS INDÉSIRABLES

Douleurs musculaires, articulaires, tendinites : (tendon d'Achille +++)

Cutanés : Eruptions cutanées, urticaires, démangeaisons, **photosensibilisation, mycoses**

Neurologiques : Maux de tête, vertiges, somnolence, insomnie, convulsions, troubles de la vision

Digestifs : Diarrhées, vomissements, nausées, douleurs abdominales

Biologiques : Perturbations au niveau foie, du rein, du bilan sanguin et du potassium

Liste non exhaustive

PRÉCAUTIONS GÉNÉRALES

Attention à la conduite



Avis médical :

- **Douleurs, inflammations tendons** (surtout au niveau du pied) pendant et jusqu'à plusieurs mois après l'arrêt
- Sensation battements du cœur irréguliers ou rapides
- Diarrhées sévères, persistantes

Éviter l'exposition au soleil pendant le traitement et les 2 jours suivant l'arrêt.

En cas d'exposition: Se couvrir (chapeaux, vêtements longs), crème solaire indice IP50+



Pendant la durée de votre traitement, **signaler** la prise de ce traitement à tout professionnel de santé que vous consultez.

Ne pas arrêter la prise de ce médicament **avant la date de fin** prescrite par votre médecin.

En cas d'arrêt prématuré du médicament, risque: de reprise de l'infection, d'aggravation de l'état de santé, d'augmentation des résistances de la bactérie.

NOTES

Pour toutes questions supplémentaires :

Site du centre de référence Nord- Ouest pour le traitement des infections ostéo-articulaires complexe : <http://www.crioac.org/>
n° vert : 0805 400 910

Téléphone du service d'hospitalisation :
03.20.44.64.53



Document destiné aux patients de chirurgie orthopédie – traumatologie

Lévofoxacine
LEVOLOXACINE® TAVANIC®
Voie intraveineuse

Flacon 250 mg / 500 mg

Nom :

Prénom :

Date de naissance :/...../.....

Document remis le :/...../.....

Par (fonction):

.....