

**TEDIZOLID****TEDIZOLID® SIVEXTRO®**

200 mg comprimé

Ce médicament est un antibiotique

Il ne doit pas être interrompu sans avis médical

CHU Lille · Processus de Pharmacie Clinique

VOTRE POSOLOGIE

comprimé(s) à mg fois par jour *au cours ou en dehors d'un repas*

☐ Matin ☐ Midi ☐ Soir Pendant jours Jusqu'au / /

INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

Si vous prenez les médicaments suivants,

Pansements gastriquesGAVISCON®
CARBOLEVURE®
CARBOSYLANE®
SMECTA®
POLYSILANE®**Décaler la prise**à 2h de distance
de l'antibiotique

Médicaments contre le cancer :

Imatinib**Lapatinib**

Immunosuppresseurs :

Méthotrexate

Hypocholestérolémiants :

Rosuvastatine**Sulfasalazine****Topotécan****Signaler à votre médecin**traitant la prise de
SIVEXTRO® pour qu'il
puisse éventuellement
adapter vos traitements
pendant la durée de
l'antibiotique**IMAO B****Pethidine****Tryptan****Association contre
indiquée***Liste non exhaustive***EN CAS D'OUBLI**Prenez la dose oubliée le plus tôt possible jusqu'à
8 heures avant la prochaine dose prévue.Si ce délai est de moins de **8 heures**, attendez la
prochaine dose.**Ne pas doubler** la dose suivante pour compenser la dose
oubliée.**EN CAS DE VOMISSEMENTS**

- Si vomissements jusqu'à **2 heures** après la prise :
repandre l'antibiotique
- Si vomissements plus de **2 heures** après la prise : **ne pas
repandre l'antibiotique**

Pendant la durée de votre traitement, **signaler** la prise de ce
traitement à tout professionnel de santé que vous consultez.**Ne pas arrêter** la prise de ce médicament **avant la date de
fin** prescrite par votre médecin.En cas d'arrêt prématuré du médicament, **risque** : de reprise
de l'infection, d'aggravation de l'état de santé, d'augmentation
des résistances de la bactérie.**EFFETS INDÉSIRABLES****Généraux** : Fatigue**Digestifs** : Diarrhées, vomissements, nausées, douleurs
abdominales, constipation**Neurologiques** : Céphalées, sensation vertigineuse**Cutanés** : Prurit généralisé**Biologiques** : Troubles de la numération formule sanguine,
trouble des enzymes hépatiques*Liste non exhaustive***PRÉCAUTIONS**

Diarrhées, sueurs, confusions, tremblements

Troubles de la **vision** (vision floue, Couleurs
anormales)

Fatigue, pâleur, frissons

Fourmillements des mains, pieds, sensations de brûlure :
arrêt immédiat et consulter votre médecin**Avis
médical****Attention à la conduite**

INFORMATIONS PRATIQUES

- Conserver dans un endroit sec à température ambiante, hors de la vue et de la portée des enfants
- **Ne pas croquer, ne pas écraser**
- Délivré **dans la pharmacie à usage intérieur de l'hôpital** sur présentation de l'ordonnance de l'hôpital ou de votre médecin traitant

NOTES

Document destiné aux patients de chirurgie
orthopédie – traumatologie

POUR TOUTES QUESTIONS SUPPLÉMENTAIRES

Site du centre de référence Nord-Ouest pour le traitement
des infections ostéo-articulaires complexes :

<http://www.crioac.org/>

n° vert : **0805 400 910**

Téléphone du service d'hospitalisation :
03.20.44.64.53

Tédizolide SIVEXTRO®

Comprimé 200 mg

Nom :

Prénom :

Date de naissance :

Document remis le :

Par (fonction) :



Processus de Pharmacie Clinique

Version d'août 2021