

# ACIDE FUSIDIQUE

**FUCIDINE®** 250mg/5ml suspension buvable 90ml,

Ce médicament est un **antibiotique**

**Il ne doit pas être interrompu sans avis médical**

## INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES



Si vous prenez les médicaments suivants,

**Médicaments diminuant le taux de cholestérol**

Pravastatine  
ELISOR®  
VASTEN®

Ne pas associer pendant le traitement et 7 jours après.

**Les statines**

Simvastatine  
ZOCOR®

Fluvastatine  
LESCOL®

Atorvastatine  
TAHOR®

Rosuvastatine  
CRESTOR®

Augmentation de l'effet des statines et donc de leurs effets indésirables.

**Ciclosporine**

NEORAL®

SANDIMMUN®  
Voie intra-veineuse

Augmentation des concentrations de ciclosporine, risque de perturbation de la fonction rénale

**Anti-Vitamines K (AVK)**

Fluindione  
Warfarine  
Acénocoumarol

PREVISCAN®  
COUMADINE®  
SINTROM®

Réaliser des INR plus fréquemment

Liste non exhaustive

## VOTRE POSOLOGIE

..... cuillère(s)-mesure de 5ml (soit ..... mg)

.... fois par jour **au cours d'un repas**

Matin       Midi       Soir

Pendant ..... jours

Jusqu'au ...../...../.....

## EN CAS D'OUBLI

Si vous avez oublié de prendre une dose, prenez la suivante à l'heure habituelle.

**Ne pas doubler** la dose suivante pour compenser la dose oubliée



## EN CAS DE VOMISSEMENTS

Si vomissements jusqu'à **2 heures** après la prise : ➔ reprendre l'antibiotique

Si vomissements plus de **2 heures** après la prise : ➔ ne pas reprendre l'antibiotique

Pendant la durée de votre traitement, **signaler** la prise de ce traitement à tout professionnel de santé que vous consultez.

**Ne pas arrêter** la prise de ce médicament **avant la date de fin** prescrite par votre médecin.

En cas d'arrêt prématuré du médicament, risque : reprise de l'infection, aggravation de l'état de santé, augmentation des résistances de la bactérie

## EFFETS INDÉSIRABLES

**Digestifs** : diarrhées, nausées, vomissements

**Biologiques** : perturbation au niveau du foie du rein et du bilan sanguin

**Cutanés** : éruptions cutanées, urticaires, démangeaisons

**Neurologiques** : maux de tête, somnolence

Liste non exhaustive

## PRÉCAUTIONS

Douleur et faiblesse musculaire

Eruption cutanée, fièvre, cloques sur la peau, plaie dans la bouche

Jaunisse, urine foncée, selles pâles, nausées, vomissements, perte d'appétit

Avis médical

Bien agiter le flacon avant chaque utilisation.

L'utilisation de la cuillère-mesure est indispensable pour prélever une quantité précise



## INFORMATIONS PRATIQUES

Conserver dans un endroit sec à température ambiante, hors de la vue et de la portée des enfants.

Délivré **dans votre pharmacie** sur présentation de l'ordonnance de l'hôpital ou de votre médecin traitant

## NOTES

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Pour toutes questions supplémentaires :

Site du centre de référence Nord- Ouest pour le traitement des infections ostéo-articulaires complexe : <http://www.crioac.org/>  
n° vert : 0805 400 910

Téléphone du service d'hospitalisation :  
03.20.44.64.53



Document destiné aux patients de chirurgie orthopédie – traumatologie

**Acide fusidique FUCIDINE®**

250MG/5ML  
Suspension buvable 90ML

Nom : .....

Prénom : .....

Date de naissance : ...../...../.....

Document remis le : ...../...../.....

Par : .....

Fonction : .....