

# TRIMÉTHOPRIME / SULFAMÉTHOXAZOLE : COTRIMOXAZOLE

**BACTRIM® ou BACTRIM FORTE®** comprimé

Ce médicament est un **antibiotique**

**Il ne doit pas être interrompu sans avis médical**

## INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES



Si vous prenez les médicaments suivants,

<b>Pansements gastriques</b>	<b>GAVISCON® CARBOLEVURE® SMECTA®</b>	Intervalles d'au moins 2 heures avec ces médicaments
<b>Anti-vitamines K</b>  Warfarine Fluindione Acénocoumarol	<b>COUMADINE® PREVISCAN® SINTROM®</b>	Diminution de l'effet Réaliser des INR plus fréquemment
Méthotrexate	<b>NOVATREX®</b>	<b>Association interdite</b> Augmentation de la toxicité au niveau du sang du méthotrexate
Ciclosporine	<b>NEORAL®</b>	Dosage plasmatique pendant la durée du traitement et à l'arrêt
<b>Médicaments hyperkaliémiants</b> <b>Exemples : Médicaments pour la tension artérielle</b>		Risque augmentation du taux de potassium
Répaglinide Gliclazide Glimépiride Glibenclamide	<b>NOVONORM® DIAMICRON® AMAREL® DAONIL®</b>	Augmentation de leur efficacité Risque d'hypoglycémie

*Liste non exhaustive*

## VOTRE POSOLOGIE

..... comprimé(s)  
de ..... à ...../..... mg  
.... fois par jour, **au cours des repas**  
 Matin       Midi       Soir  
Pendant ..... jours  
Jusqu'au ...../...../.....

## EN CAS D'OUBLI

Si vous avez oublié de prendre une dose, prenez la suivante à l'heure habituelle.

**Ne pas doubler** la dose suivante pour compenser la dose oubliée



## EN CAS DE VOMISSEMENTS

Si vomissements jusqu'à **2 heures** après la prise : ➡ reprendre l'antibiotique

Si vomissements plus de **2 heures** après la prise : ➡ ne pas reprendre l'antibiotique

Pendant la durée de votre traitement, **signaler** la prise de ce traitement à tout professionnel de santé que vous consultez.

**Ne pas arrêter** la prise de ce médicament **avant la date de fin** prescrite par votre médecin.

En cas d'arrêt prématuré du médicament, risque : de reprise de l'infection, d'aggravation de l'état de santé, d'augmentation des résistances de la bactérie

## EFFETS INDÉSIRABLES

**Digestifs** : diarrhées, nausées, vomissements, douleurs estomac

**Neurologiques** : Tremblements, sifflements, bourdonnements, engourdissements, fourmillements

**Cutanés** : éruptions cutanées, urticaires, démangeaisons, photosensibilisation

**Biologiques** : perturbation au niveau du foie, du rein et du sang, augmentation du taux de potassium

*Liste non exhaustive*

## PRÉCAUTIONS

**Eviter l'exposition au soleil** pendant le traitement et les 3 jours suivant l'arrêt.

En cas d'exposition directe: Se couvrir (chapeaux, vêtements longs), crème solaire indice IP50+



**Avoir un bon apport hydrique**, boire au moins 1,5 à 2L d'eau par jour (risque cristaux dans urines)

**En cas de gastro-entérites** : arrêt du bactrim et contacter votre médecin. Ne prenez pas de ralentisseurs du transit lopéramide Imodium®

Eruptions cutanées, démangeaisons  
Fatigue, pâleur, fièvre, saignements de nez  
Jaunisse

} **Avis médical**

Risque carence en **acide folique** : supplémentation possible (Spéciafoldine®)

**Eviter la consommation d'alcool**

## INFORMATIONS PRATIQUES

**Conserver** dans un endroit sec à température ambiante, hors de la vue et de la portée des enfants

Ne pas couper, Ne pas croquer, ne pas écraser

Avaler avec un grand verre d'eau

Délivré **dans votre pharmacie** sur présentation de l'ordonnance de l'hôpital ou de votre médecin traitant

## NOTES

Pour toutes questions supplémentaires :

Site du centre de référence Nord- Ouest pour le traitement des infections ostéo-articulaires complexe : <http://www.crioac.org/>  
n° vert : 0805 400 910

Téléphone du service d'hospitalisation :  
03.20.44.64.53



Document destiné aux patients de chirurgie orthopédie – traumatologie

Sulfaméthoxazole 800g + Triméthoprime 160mg  
**Cotrimoxazole  
BACTRIM FORTE®**  
Sulfaméthoxazole 400g + Triméthoprime 80mg  
**Cotrimoxazole  
BACTRIM®**

Nom : .....

Prénom : .....

Date de naissance : ...../...../.....

Document remis le : ...../...../.....

Par (fonction): .....

.....