

CEFTRIAXONE

CEFTRIAXONE® ROCEPHINE® Flacon 250mg, 500 mg, 1g Voie intraveineuse et sous-cutanée

Ce médicament est un **antibiotique**

Il ne doit pas être interrompu sans avis médical

INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES



Si vous prenez les médicaments suivants,

Anti-vitamines K (AVK)

Fluindione
Warfarine
Acénocoumarol

PREVISCAN®
COUMADINE®
SINTROM®

Réaliser des INR plus fréquemment

Liste non exhaustive

VOTRE POSOLOGIE

Une injection à g

- Voie intra-veineuse
 - Voie sous-cutanée
- fois par jour

- Matin
 - Midi
 - Soir
- Pendant jours

Pendant la durée de votre traitement, **signaler** la prise de ce traitement à tout professionnel de santé que vous consultez.

Ne pas arrêter la prise de ce médicament **avant la date de fin** prescrite par votre médecin.

En cas d'arrêt prématuré du médicament, risque : de reprise de l'infection, d'aggravation de l'état de santé, d'augmentation des résistances de la bactérie.

INFORMATIONS PRATIQUES

Les flacons doivent être conservés dans un endroit sec à température ambiante (moins de 25°C)

Les flacons de 500mg et 1g sont délivrés dans **votre pharmacie de ville** sur présentation de **l'ordonnance de l'hôpital ou de votre médecin traitant**.

Les flacons de 2g sont délivrés par **la pharmacie de l'hôpital** sur présentation de l'ordonnance de l'hôpital.

EFFETS INDÉSIRABLES

Neurologiques : Céphalées, étourdissements, vertiges

Digestifs : Diarrhées, vomissements, nausées

Cutanés : Eruptions cutanées, urticaires

Biologiques : Perturbations au niveau du foie, du rein, du sang

Liste non exhaustive

PRÉCAUTIONS GÉNÉRALES



Inscrit sur la liste des médicaments dopants.

Avis médical :

- Signes d'allergies : éruptions cutanées, fièvre, gonflement
- Diarrhées sévères, persistantes
- Douleur hypocondre droit, signes de lithiase (douleurs lombaires et pendant la miction)

PRÉCAUTIONS SITE D'INJECTION

Rougeur, chaleur, gonflement, sensibilité, douleur, présence pus ou écoulement

↓
Contacter votre infirmier

