

CIPROFLOXACINE

CIPROFLOXACINE® CIFLOX® 250 ou 500 ou 750 mg comprimé, 500mg/5ml Granulés pour suspension buvable

Ce médicament est un **antibiotique**

Il ne doit pas être interrompu sans avis médical

INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

Fer	TARDYFERON® TIMOFEROL® INOFER®	Laisser un intervalle de 2h entre ces médicaments et la ciprofloxacine
Antiacides	MAALOX® ROCGEL® KEAL®	
Compléments minéraux contenant magnésium, calcium	BEROCCA® MAGNEB6®	
Pansements gastriques	GAVICON® CARBOLEVURE® SMECTA®	
Métoclopramide	PRIMPERAN®	Diminution efficacité Ciflox®
Oméprazole	INEXIUM®	
Ciclosporine	NEORAL® SANDIMMUN® Voie intra-veineuse	Dosage plasmatique et surveillance fonction rénale pendant et à l'arrêt du traitement
Anti-Vitamines K (AVK)	PREVISCAN® COUMADINE® SINTROM®	Réaliser des INR plus fréquemment
Zolpidem	STILNOX®	Augmentation de son efficacité

Liste non exhaustive

INTERACTIONS ALIMENTAIRES

Ne prendre ce médicament avec des produits laitiers (lait, yaourt, jus d'orange enrichis en calcium): Espacer les administrations d'**au moins 2h avant** ou **4h après** la prise de ces aliments

VOTRE POSOLOGIE

..... comprimé(s) à mg ou cuillères-mesure
.... fois par jour **au cours ou en dehors d'un repas**

Matin Midi Soir

Pendant jours
Jusqu'au/...../.....

EN CAS D'OUBLI

Si vous avez oublié de prendre une dose, prenez la suivante à l'heure habituelle.

Ne pas doubler la dose suivante pour compenser la dose oubliée



EN CAS DE VOMISSEMENTS

Si vomissements jusqu'à **2 heures** après la prise : ➡ reprendre l'antibiotique
Si vomissements plus de **2 heures** après la prise : ➡ ne pas reprendre l'antibiotique

Pendant la durée de votre traitement, **signaler** la prise de ce traitement à tout professionnel de santé que vous consultez.

Ne pas arrêter la prise de ce médicament **avant la date de fin** prescrite par votre médecin.

En cas d'arrêt prématuré du médicament, risque : de reprise de l'infection, d'aggravation de l'état de santé, d'augmentation des résistances de la bactérie

EFFETS INDÉSIRABLES

Douleurs musculaires, articulaires, tendinites : tendon d'Achille +++ mais tous les tendons peuvent être touchés

Cutanés : Eruptions cutanées, urticaires, démangeaisons, **photosensibilisation**

Neurologiques : Maux de tête, vertiges, somnolence, insomnie, convulsions, troubles de la vision

Digestifs : Diarrhées, vomissements, nausées

Biologiques : Perturbation au niveau foie, du rein, du bilan sanguin et du potassium

Cardiaques : Palpitations

Liste non exhaustive

PRÉCAUTIONS

Douleurs, inflammations tendons pendant et jusqu'à plusieurs mois après l'arrêt
Sensations battements du cœur irréguliers ou rapides

Avis médical

Éviter l'exposition au soleil pendant le traitement et les 2 jours suivant l'arrêt.

En cas d'exposition: Se couvrir (chapeaux, vêtements longs), crème solaire indice IP50+



Diabétique, risque d'hypoglycémie ou d'hyperglycémie : Surveiller fréquemment la glycémie

Troubles de la vision Attention à la conduite



