

DOXYCYCLINE

DOXYCYCLINE® DOXY® DOXYLIS® GRANUDOXY® SPANOR® 100 mg comprimé, **TOLEXINE GE®** 100 mg microgranules en comprimé

Ce médicament est un antibiotique

Il ne doit pas être interrompu sans avis médical

INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES



Si vous prenez les médicaments suivants,

Calcium	CACIT® OROCAL®	
Fer	TARDYFERON® TIMOFEROL® INOFER®	
Zinc	EFFIZINC® RUBOZINC®	Laisser un intervalle de 2h entre ces médicaments et la Doxycycline
Antiacides contenant magnésium, aluminium, calcium	MAALOX® PHOSPHALUGEL® ROCGEL® KEAL®	
Pansements gastriques	GAVISCON® CARBOLEVURE® SMECTA®	
Anti-Vitamines K (AVK) Fluindione Warfarine Acénocoumarol	PREVISCAN® COUMADINE® SINTROM®	Réaliser des INR plus fréquemment
Anti-épileptiques	Carbamazépine TEGRETOL® Phénytoïne DI-HYDAN®	Diminution efficacité de la Doxycycline

Liste non exhaustive

VOTRE POSOLOGIE

.... comprimé(s) à mg
.... fois par jour, **au cours d'un repas avec un grand verre d'eau**

Position assise ou debout

Matin Midi Soir

Pendant jours

Jusqu'au/...../.....

EN CAS D'OUBLI

Si vous avez oublié de prendre une dose, prenez la suivante à l'heure habituelle.

Ne pas doubler la dose suivante pour compenser la dose oubliée



EN CAS DE VOMISSEMENTS

Si vomissements jusqu'à **1 heure** après la prise :

➡ reprendre l'antibiotique

Si vomissements plus de **1 heure** après la prise : ne

➡ pas reprendre l'antibiotique

Pendant la durée de votre traitement, **signaler** la prise de ce traitement à tout professionnel de santé que vous consultez.

Ne pas arrêter la prise de ce médicament **avant la date de fin** prescrite par votre médecin.

En cas d'arrêt prématuré du médicament, risque : de reprise de l'infection, d'aggravation de l'état de santé, d'augmentation des résistances de la bactérie

EFFETS INDÉSIRABLES

Digestifs : diarrhées, nausées, vomissements, douleurs, perte appétit

Neurologiques : maux de tête, troubles de la vision, somnolence

Cutanés : éruptions cutanées, urticaires, démangeaisons, photosensibilisation

Biologiques : perturbation au niveau du foie et du bilan sanguin

Liste non exhaustive

PRÉCAUTIONS

Eviter l'exposition au soleil pendant le traitement et les 10 jours suivant l'arrêt.

En cas d'exposition directe: Se couvrir (chapeaux, vêtements longs), crème solaire indice IP50+



Bien respecter les conditions d'administration : au cours d'un repas avec grand verre d'eau et position debout ou assise (ne pas se coucher dans l'heure qui suit l'administration) pour éviter **brûlures et douleurs œsophages**



Maux de têtes, étourdissements
Trouble de la vision
Vomissements

Avis
médical

