

## FUNGIZONE® 10%,

Ce médicament est un **antifongique**

### INDICATION

Ce médicament est prescrit pour prévenir le risque de mycoses pouvant être favorisé par votre prise d'antibiotiques.

### VOTRE POSOLOGIE

..... cuillère(s) mesure  
.... fois par jour **en dehors des repas**  
 Matin       Midi       Soir  
Pendant ..... jours  
Jusqu'au ...../...../.....

### EFFETS INDÉSIRABLES et PRÉCAUTIONS

**Digestifs** : diarrhées, nausées, vomissements

**Jaunissement passager des dents**, atténué avec le brossage

### EN CAS D'OUBLI



Si vous avez oublié de prendre une dose, prenez la suivante à l'heure habituelle.

**Ne pas doubler** la dose suivante pour compenser la dose oubliée



### INFORMATIONS PRATIQUES

Conserver dans un endroit sec à température ambiante, hors de la vue et de la portée des enfants.

Délivré **dans votre pharmacie** sur présentation de l'ordonnance de l'hôpital ou de votre médecin traitant

Pour toutes questions supplémentaires :

Site du centre de référence Nord- Ouest pour le traitement des infections ostéo-articulaires complexe : <http://www.crioac.org/>  
n° vert : 0805 400 910

Téléphone du service d'hospitalisation :  
03.20.44.64.53

