

# MINOCYCLINE

MYNOCINE® MINOCYCLINE® 100mg gélule ou comprimé

Ce médicament est un **antibiotique**

**Il ne doit pas être interrompu sans avis médical**

## INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES



Si vous prenez les médicaments suivants,

<b>Calcium</b>	CACIT® OROCAL® JUVAMINE VIT D et Ca ®	Laisser un intervalle de 2h entre ces médicaments et la minocycline (Mynocine®)
<b>Zinc</b>	ZINC JUVAMINE® EFFIZINC® RUBOZINC®	
<b>Fer</b>	TARDYFERON® TIMOFEROL® INOFER®	
<b>Antiacides contenant du magnésium ou de l'aluminium</b>	MAALOX® PHOSPHALUGEL® ROCGEL® KEAL®	
<b>Pansements digestifs</b>	GAVICON® CARBOLEVURE® SMECTA®	
<b>Anti-Vitamines K (AVK)</b>		
<b>Fluidione Warfarine Acénocoumarol</b>	PREVISCAN® COUMADINE® SINTROM®	Réaliser des INR plus fréquemment

Liste non exhaustive

## VOTRE POSOLOGIE

..... gélule(s)/comprimé(s) à 100 mg  
.... fois par jour **au cours d'un repas**

Matin       Midi       Soir

Pendant ..... jours

Jusqu'au ...../...../.....

## EN CAS D'OUBLI

Si vous avez oublié de prendre une dose, prenez la suivante à l'heure habituelle.

**Ne pas doubler** la dose suivante pour compenser la dose oubliée



## EN CAS DE VOMISSEMENTS

Si vomissements jusqu'à **2 heures** après la prise : ➡ reprendre l'antibiotique  
Si vomissements plus de **2 heures** après la prise : ➡ ne pas reprendre l'antibiotique

Pendant la durée de votre traitement, **signaler** la prise de ce traitement à tout professionnel de santé que vous consultez.

**Ne pas arrêter** la prise de ce médicament **avant la date de fin** prescrite par votre médecin.

En cas d'arrêt prématuré du médicament, **risque** : de reprise de l'infection, d'aggravation de l'état de santé, d'augmentation des résistances de la bactérie.

## EFFETS INDÉSIRABLES

**Digestifs** : Diarrhées, douleurs abdominales

**Cutanés** : Eruptions cutanées, urticaires, démangeaisons

**Biologiques** : Perturbation au niveau du foie, du rein et du bilan sanguin.

**Neurologiques** : Etourdissements, vertiges, maux de tête, troubles de la vision augmentation de la pression à l'intérieur du crâne, altération de l'audition (sifflements, bourdonnements)

**Respiratoires** : Toux, difficulté à respirer

Liste non exhaustive

## PRÉCAUTIONS

**Eviter l'exposition au soleil** pendant le traitement et les 10 jours suivant l'arrêt

En cas d'exposition: Se couvrir (chapeaux, vêtements longs), crème solaire indice IP50+



**Coloration brune-bleu des zones photoexposées ou sur les cicatrices** : Régressive à l'arrêt du traitement

**Fièvre, éruptions cutanées**

**Trouble la vision, maux de tête**

**Attention à la conduite**



Avis  
médical

## INFORMATIONS PRATIQUES

Conserver dans un endroit sec à température ambiante ne dépassant pas 30°C, hors de la vue et de la portée des enfants

Ne pas ouvrir les gélules

Ne pas croquer, ne pas écraser

Avaler avec un grand verre d'eau

Délivré **dans votre pharmacie** sur présentation de l'ordonnance de l'hôpital ou de votre médecin traitant

## NOTES

Pour toutes questions supplémentaires :

Site du centre de référence Nord- Ouest pour le traitement des infections ostéo-articulaires complexe : <http://www.crioac.org/>  
n° vert : 0805 400 910

Téléphone du service d'hospitalisation :  
03.20.44.64.53



Document destiné aux patients de chirurgie orthopédie – traumatologie

**Minocycline**  
**MINOCYCLINE® MYNOCINE®**

Comprimé ou Gélule 100mg

Nom : .....

Prénom : .....

Date de naissance : ...../...../.....

Document remis le : ...../...../.....

Par (fonction): .....

.....