

MOXIFLOXACINE

MOXIFLOXACINE® IZILOX® 400mg

Ce médicament est un **antibiotique**
Il ne doit pas être interrompu sans avis médical

INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES



Si vous prenez les médicaments suivants,

| | | |
|---|---|---|
| Fer | TARDYFERON® TIMOFEROL® INOFER® | Laisser un intervalle de 6h entre ces médicaments et la Moxifloxacine |
| Pansements gastriques | GAVISCON® CARBOLEVURE® SMECTA® | |
| Antiacides | MAALOX® ROCGEL® KEAL® | |
| Compléments minéraux contenant magnésium, calcium | BEROCCA® MAGNEB6® | |
| Médicaments cardiaques Disopyramide Lidocaïne Amiodarone Sotalol | RYTHMODAN® XYLOCARD® CORDARONE® SOTALEX® | Risque de troubles cardiaques |
| Antidépresseurs Amitriptyline Clomipramine | LAROXYL® ANAFRANIL® | |
| Anti-Vitamines K (AVK) Fluindione Warfarine Acénocoumarol | PREVISCAN® COUMADINE® SINTROM® | Réaliser des INR plus fréquemment |

Liste non exhaustive

VOTRE POSOLOGIE

..... comprimé(s) à mg
 fois par jour **au cours ou en dehors d'un repas**

- Matin Midi Soir
- Pendant jours
 Jusqu'au/...../.....

EN CAS D'OUBLI

Si vous avez oublié de prendre une dose, prenez la suivante à l'heure habituelle.

Ne pas doubler la dose suivante pour compenser la dose oubliée



EN CAS DE VOMISSEMENTS

Si vomissements jusqu'à **30 minutes** après la prise : ➡ reprendre l'antibiotique

Si vomissements plus de **30 minutes** après la prise : ➡ ne pas reprendre l'antibiotique

Pendant la durée de votre traitement, **signaler** la prise de ce traitement à tout professionnel de santé que vous consultez.

Ne pas arrêter la prise de ce médicament **avant la date de fin** prescrite par votre médecin.

En cas d'arrêt prématuré du médicament, risque : de reprise de l'infection, d'aggravation de l'état de santé, d'augmentation des résistances de la bactérie

EFFETS INDÉSIRABLES

Douleurs musculaires, articulaires, tendinites tendon d'Achille+++ mais tous les tendons peuvent être touchés

Cutanés : éruptions cutanées, urticaires, démangeaisons, **photosensibilisation, mycoses**

Neurologiques : agitation, anxiété, maux de tête, vertiges, troubles visuels, sensations de brûlures, engourdissements.

Digestifs : diarrhées, nausées, vomissements

Biologiques : perturbation au niveau du foie, rein et sang

Cardiaques : Palpitations

Liste non exhaustive

PRÉCAUTIONS

Douleurs, inflammations tendons pendant et jusqu'à plusieurs mois après l'arrêt
Sensations battements du cœur irréguliers ou rapides

Avis médical

Eviter l'exposition au soleil pendant le traitement et les 2 jours suivant l'arrêt.

En cas d'exposition: Se couvrir (chapeaux, vêtements longs), crème solaire indice IP50+



Diabétique, risque d'hypoglycémie ou d'hyperglycémie : Surveiller fréquemment la glycémie

Troubles de la vision Attention à la conduite



INFORMATIONS PRATIQUES

Conserver dans un endroit sec à température ambiante, hors de la vue et de la portée des enfants.

Les comprimés **ne doivent pas être coupés**
Ne pas croquer / Ne pas écraser

Délivré **dans votre pharmacie** sur présentation de l'ordonnance de l'hôpital ou de votre médecin traitant

NOTES

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Pour toutes questions supplémentaires :

Site du centre de référence Nord- Ouest pour le traitement des infections ostéo-articulaires complexe : <http://www.crioac.org/>
n° vert : 0805 400 910

Téléphone du service d'hospitalisation :
03.20.44.64.53



Document destiné aux patients de chirurgie orthopédie – traumatologie

Moxifloxacine
MOXIFLOXACINE® IZILOX®

Comprimé 400 mg

Nom :

Prénom :

Date de naissance :/...../.....

Document remis le :/...../.....

Par (fonction):

.....