

# CLOXACILLINE / ORBENINE® et OXACILLINE /BRISTOPEN®

Flacon 1g Voie intraveineuse

Ce médicament est un **antibiotique**

**Il ne doit pas être interrompu sans avis médical**

## INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES



Si vous prenez les médicaments suivants,

### Anti-vitamines K (AVK)

Fluindione  
Warfarine  
Acénocoumarol

PREVISCAN®  
COUMADINE®  
SINTROM®

Réaliser des INR plus fréquemment

### Méthotrexate

NOVATREX®  
IMETH®  
METOJECT®

Risque d'augmentation de la toxicité du méthotrexate par diminution de son élimination

*Liste non exhaustive*

## INFORMATIONS PRATIQUES

Les flacons doivent être conservés dans un endroit sec à température ambiante (moins de 25°C)

Délivré dans **votre pharmacie de ville** sur présentation de **l'ordonnance de l'hôpital ou de votre médecin traitant.**

## VOTRE POSOLOGIE

Une injection de ..... mg

..... fois par jour

Par voie intraveineuse

Matin                       Midi                       Soir

Pendant ..... jours

Jusqu'au ...../...../.....

Pendant la durée de votre traitement, **signaler** la prise de ce traitement à tout professionnel de santé que vous consultez.

**Ne pas arrêter** la prise de ce médicament **avant la date de fin** prescrite par votre médecin.

En cas d'arrêt prématuré du médicament, risque : de reprise de l'infection, d'aggravation de l'état de santé, d'augmentation des résistances de la bactérie.

## EFFETS INDÉSIRABLES

**Digestifs** : Vomissements, nausées, diarrhées

**Neurologiques** : Confusion, mouvements incontrôlés

**Cutanés** : Eruptions et démangeaisons

**Biologiques** : Perturbations au niveau du rein, du foie et du sang.

*Liste non exhaustive*

## PRÉCAUTIONS GÉNÉRALES

### Avis médical :

- Signes d'allergies : éruptions cutanées, fièvre, gonflement, gêne respiratoire
- Diarrhées sévères, persistantes



## PRÉCAUTIONS SITE D'INJECTION

Rougeur, chaleur, gonflement, sensibilité, douleur, présence pus ou écoulement.



Contactez votre infirmier

