

PIPERACILLINE TAZOBACTAM

PIPERACILLINE/TAZOBACTAM® TAZOCILLINE® 4g/0,5g ou 2g/0,25g Voie intraveineuse

Ce médicament est un **antibiotique**

Il ne doit pas être interrompu sans avis médical

INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES



Si vous prenez les médicaments suivants,

Anti-Vitamines K (AVK)

Fluindione
Warfarine
Acénocoumarol

PREVISCAN®
COUMADINE®
SINTROM®

Réaliser des INR plus fréquemment

Méthotrexate

NOVATREX®
IMETH®
METOJECT®

Mauvaise élimination du Méthotrexate : risque d'augmentation des effets indésirables

Liste non exhaustive

VOTRE POSOLOGIE

1 injection de
toutes les heures
soitfois par jour
Par voie intraveineuse

Matin Midi Soir

Pendant jours
Jusqu'au/...../.....

Pendant la durée de votre traitement, signaler la prise de ce traitement à tout professionnel de santé que vous consultez.

Ne pas arrêter la prise de ce médicament **avant la date de fin** prescrite par votre médecin.

En cas d'arrêt prématuré du médicament, risque : de reprise de l'infection, d'aggravation de l'état de santé, d'augmentation des résistances de la bactérie.

EFFETS INDÉSIRABLES

Digestifs : Diarrhées, vomissements, nausées

Cutanés : Eruptions cutanées, **mycoses**

Biologiques : perturbation au niveau du foie, et sang (anémie, diminution des plaquettes et du taux de potassium)

Neurologiques : insomnies, maux de tête

Liste non exhaustive

PRÉCAUTIONS GÉNÉRALES

Signes d'allergie :
éruption cutanée, fièvre,
gonflement

Diarrhées sévères, persistantes
Pâleur, fatigue (signes d'anémie)

Saignements, bleus inexplicables
(signes de diminution des
plaquettes dans le sang)

**Avis
médical**

Interactions possibles avec réactifs de laboratoire : prévenir biologiste

PRÉCAUTIONS SITE D'INJECTION

Rougeur, chaleur, gonflement, sensibilité,
douleur, présence pus ou écoulement

↓
Contacter votre infirmier

INFORMATIONS PRATIQUES

Les flacons doivent être conservés au réfrigérateur entre 2°C et 8°C

Délivré dans **votre pharmacie de ville** sur présentation de **l'ordonnance de l'hôpital**.

NOTES

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Pour toutes questions supplémentaires :
Site du centre de référence Nord- Ouest pour le
traitement des infections ostéo-articulaires
complexe : <http://www.crioac.org/>
n° vert : 0805 400 910

Téléphone du service d'hospitalisation :
03.20.44.64.53



Document destiné aux patients de chirurgie
orthopédie – traumatologie

**Pipéracilline/Tazobactam
PIPERACILLINE/TAZOBACTAM®
TAZOCILLINE®
Voie intraveineuse**

Flacon 4g/0,5g ou 2g/0,25g



Nom :
Prénom :
Date de naissance :/...../.....

Document remis le :/...../.....
Par (fonction):
.....