

VANCOMYCINE

VANCOMYCINE® Flacon 125 mg, 250 mg, 500 mg, 1 g Voie intraveineuse

Ce médicament est un **antibiotique**

Il ne doit pas être interrompu sans avis médical

INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES



Si vous prenez les médicaments suivants,

Anti-vitamines K (AVK)

Fluindione
Warfarine
Acénocoumarol

PREVISCAN®
COUMADINE®
SINTROM®

Réaliser des INR plus fréquemment

Liste non exhaustive

VOTRE POSOLOGIE

Une injection de
Toutes les ... heures
Soit fois par jour
Ou en continue
Par voie intraveineuse

Matin Midi Soir

Pendant jours
Jusqu'au/...../.....

EFFETS INDÉSIRABLES

Digestifs : Vomissements, nausées

Auditives : Troubles de l'audition

Cutanés : Eruptions et démangeaisons cutanées transitoires sur le visage, épaules, cou, dos
Irritation au niveau de la veine où la vancomycine a été injecté

Musculaires : Douleur pulsatile dans le cou et le dos

Biologiques : Perturbations au niveau du rein, du sang

Liste non exhaustive

PRÉCAUTIONS GÉNÉRALES

Réalisation de dosages pour surveiller le taux de médicament dans le sang.

Avis médical :

- Troubles d'audition
- Signes d'allergies : éruption cutanées, fièvre, gonflement
- Diarrhées sévères, persistantes
- Signes de phlébite (caillot dans la veine) au moment de l'injection



PRÉCAUTIONS SITE D'INJECTION

Rougeur, chaleur, gonflement, sensibilité, douleur, présence pus ou écoulement

↓
Contacter votre infirmier

INFORMATIONS PRATIQUES

Les flacons doivent être conservés dans un endroit sec à température ambiante (moins de 25°C)

Délivré **à la pharmacie de l'hôpital** sur présentation de **l'ordonnance de l'hôpital**.

Pendant la durée de votre traitement, **signaler** la prise de ce traitement à tout professionnel de santé que vous consultez.

Ne pas arrêter la prise de ce médicament **avant la date de fin** prescrite par votre médecin ou pharmacien.

En cas d'arrêt prématuré du médicament, risque : de reprise de l'infection, d'aggravation de l'état de santé, d'augmentation des résistances de la bactérie.

