

DELAFLOXACINE

QUOFENIX® Comprimé 450 mg, Voie orale

Ce médicament est un **antibiotique**

Il ne doit pas être interrompu sans avis médical

INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES



Si vous prenez les médicaments suivants,

Fer	TARDYFERON® TIMOFEROL®	Laisser un intervalle de 2h entre ces médicaments et la delafloxacine
Antiacides	MAALOX® ROCGEL® KEAL®	
Pansements digestifs	GAVISCON® CARBOLEVURE® SMECTA®	
Compléments minéraux contenant magnésium, calcium	BEROCCA® MAGNEB6®	
Anti-Vitamines K (AVK) Fluindione Warfarine Acénocoumarol	PREVISCAN® COUMADINE® SINTROM®	Réaliser des INR plus fréquemment

Liste non exhaustive

VOTRE POSOLOGIE

Un comprimé à

Toutes les 12 heures

Soit 2 fois par jour

Par voie orale

Matin Midi Soir

Pendant jours

EN CAS D'OUBLI

Si vous avez oublié de prendre une dose,

Prenez la suivante à l'heure habituelle.

Ne pas doubler la dose suivante pour compenser la dose oubliée

EN CAS DE VOMISSEMENTS

Si vomissements jusqu'à **1 heure** après la prise : reprendre l'antibiotique

Si vomissements plus de **1 heure** après la prise :

Pendant la durée de votre traitement, **signaler** la prise de ce traitement à tout professionnel de santé que vous consultez.

Ne pas arrêter la prise de ce médicament **avant la date de fin** prescrite par votre médecin.

En cas d'arrêt prématuré du médicament, risque : de reprise de l'infection, d'aggravation de l'état de santé, d'augmentation des résistances de la bactérie

EFFETS INDÉSIRABLES

Douleurs musculaires, articulaires, tendinites : (tendon d'Achille +++)

Cutanés : Eruptions cutanées, urticaires, démangeaisons, photosensibilisation, mycoses

Neurologiques : Maux de tête, vertiges, somnolence, insomnie, convulsions, troubles de la vision

Digestifs : Diarrhées, vomissements, nausées, douleurs abdominales

Biologiques : Perturbations au niveau foie, du rein, du bilan sanguin et du potassium

Liste non exhaustive

PRÉCAUTIONS GÉNÉRALES

Attention à la conduite



Avis médical :

- **Douleurs, inflammations tendons** (surtout au niveau du pied) pendant et jusqu'à plusieurs mois après l'arrêt
- Sensation battements du cœur irréguliers ou rapides
- Diarrhées sévères, persistantes

Eviter l'exposition au soleil

pendant le traitement et les 2 jours suivant l'arrêt.

En cas d'exposition : Se couvrir (chapeaux, vêtements longs), crème solaire indice IP50+



Pendant la durée de votre traitement, **signaler** la prise de ce traitement à tout professionnel de santé que vous consultez.

Ne pas arrêter la prise de ce médicament **avant la date de fin** prescrite par votre médecin.

En cas d'arrêt prématuré du médicament, risque: de reprise de l'infection, d'aggravation de l'état de santé, d'augmentation des résistances de la bactérie.

NOTES

Pour toutes questions supplémentaires :

Site du centre de référence Nord- Ouest pour le traitement des infections ostéo-articulaires complexe : <http://www.crioac.org/>
n° vert : 0805 400 910

Téléphone du service d'hospitalisation :
03.20.44.64.53



Processus de Pharmacie Clinique

Document destiné aux patients de chirurgie orthopédie – traumatologie

Delafloxacine
QUOFENIX®
Voie orale

Comprimé 450 mg

Nom :

Prénom :

Date de naissance :/...../.....

Document remis le :/...../.....

Par (fonction):

.....