

AMOXICILLINE

AMOXICILLINE® CLAMOXYL® 500 mg gélule / 1g comprimé dispersible / 125mg/5ml, 250mg/5ml, 500mg/5ml poudre pour suspension buvable

Ce médicament est un **antibiotique**

Il ne doit pas être interrompu sans avis médical

INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES



Si vous prenez les médicaments suivants,

Pansements gastriques	GAVISCON® CARBOLEVURE® SMECTA®	Laisser un intervalle de 2h entre ces médicaments et l'amoxicilline
Anti-vitamines K (AVK)	PREVISCAN® COUMADINE® SINTROM®	Réaliser des INR plus fréquemment
Fluidione Warfarine Acénocoumarol		
Méthotrexate NOVATREX®	Augmentation des effets et de la toxicité du méthotrexate	
Allopurinol ZYLORIC®	Augmentation du risque de réactions cutanées	
Tétracyclines	Doxycycline DOXY®, GRANUDOXY®, TOLEXINE® Lymecycline TETRALYSAL® Minocycline MESTACINE®	Risque de diminution des effets de l'amoxicilline
Antiacides contenant du magnésium ou de l'aluminium	MAALOX® PHOSPHALUGEL® ROCGEL® KEAL®	Laisser un intervalle de 2h entre ces médicaments

Liste non exhaustive

VOTRE POSOLOGIE

.... comprimé(s)/gélule(s) à mg
.... fois par jour **au cours ou en dehors d'un repas**

- Matin Midi Soir
Pendant jours
Jusqu'au /.... /....

EN CAS D'OUBLI

Si vous avez oublié de prendre une dose, prenez la suivante à l'heure habituelle.

Ne pas doubler la dose suivante pour compenser la dose oubliée



EN CAS DE VOMISSEMENTS

- Si vomissements jusqu'à **1 heure** après la prise :
➔ reprendre l'antibiotique
Si vomissements plus de **1 heure** après la prise :
➔ ne pas reprendre l'antibiotique

Pendant la durée de votre traitement, **signaler** la prise de ce traitement à tout professionnel de santé que vous consultez.

Ne pas arrêter la prise de ce médicament **avant la date de fin** prescrite par votre médecin.

En cas d'arrêt prématuré du médicament, risque : de reprise de l'infection, d'aggravation de l'état de santé, d'augmentation des résistances de la bactérie.

EFFETS INDÉSIRABLES

Digestifs : Diarrhées, vomissements, nausées, douleurs abdominales, colites

Cutanés : Eruptions cutanées, pustules, taches rouges, urticaires, démangeaisons, prurit, gonflement, **mycose**

Neurologiques : vertiges, céphalées, convulsions

Biologiques : Perturbations au niveau du foie, du rein et sanguin

Liste non exhaustive

PRÉCAUTIONS

Avis médical en cas de :

- **Réaction allergique** (éruption cutanée, taches rouges ou violettes sur la peau, cloques, gonflement, malaise)
- **Diarrhées** sévères et persistantes accompagnées de douleurs abdominales et fièvre.
- **Urines foncées ou selles décolorées**
- **Jaunisse**
- **Difficulté à uriner**

Bien **s'hydrater**

Possible coloration dentaire réversible à l'arrêt : Avoir une bonne hygiène dentaire

Attention à la conduite



