

CEFTAZIDIME

CEFTAZIDIME® FORTUM® Flacon 250mg, 500mg, 1g, 2g Voie Intraveineuse

Ce médicament est un **antibiotique**

Il ne doit pas être interrompu sans avis médical

INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES



Si vous prenez les médicaments suivants,

Anti-vitamines K (AVK)

Fluindione
Warfarine
Acénocoumarol

PREVISCAN®
COUMADINE®
SINTROM®

Réaliser des INR plus fréquemment

Furosémide Bumétanide

LASILIX®
BURINEX®

Augmentation de la toxicité rénale : surveillance

Liste non exhaustive

INFORMATIONS PRATIQUES

Les flacons doivent être conservés dans un endroit sec à température ambiante (moins de 25°C)

Délivré dans **votre pharmacie de ville** sur présentation de **l'ordonnance de l'hôpital**.

VOTRE POSOLOGIE

Une injection à g

.... fois par jour

Ou en continue

Par voie intra-veineuse

Matin Midi Soir

Pendant jours

Jusqu'au/...../.....

Pendant la durée de votre traitement, **signaler** la prise de ce traitement à tout professionnel de santé que vous consultez.

Ne pas arrêter la prise de ce médicament **avant la date de fin** prescrite par votre médecin.

En cas d'arrêt prématuré du médicament, risque : de reprise de l'infection, d'aggravation de l'état de santé, d'augmentation des résistances de la bactérie.

EFFETS INDÉSIRABLES

Neurologiques : Maux de têtes, vertiges

Digestifs : Diarrhées, colites

Cutanés : Eruptions cutanées, prurit

Biologiques : Perturbation au niveau du foie, du rein, du sang

Vasculaires : Inflammation d'une veine avec possibilité de formation d'un caillot qui la bouche (phlébite)

Liste non exhaustive

PRÉCAUTIONS GÉNÉRALES

Surveillance de la fonction rénale

Attention à la conduite



Avis médical :

- Diarrhées sévères, persistantes
- Suspicion de phlébites

PRÉCAUTIONS SITE D'INJECTION

Rougeur, chaleur, gonflement, sensibilité, douleur, présence pus ou écoulement

↓
Contacter votre infirmier

NOTES



Document destiné aux patients de chirurgie orthopédie – traumatologie

Ceftazidime
CEFTAZIDIME® FORTUM®
Voie Intraveineuse

Flacon 250mg / 500mg / 1g / 2g

Pour toutes questions supplémentaires :
 Site du centre de référence Nord- Ouest pour le traitement des infections ostéo-articulaires complexe : <http://www.crioac.org/>
 n° vert : 0805 400 910

Téléphone du service d'hospitalisation :
 03.20.44.64.53

Nom :

Prénom :

Date de naissance :/...../.....

Document remis le :/...../.....

Par (fonction):

.....

