

LEVOFLOXACINE

LEVOFLOXACINE® TAVANIC® 500 mg comprimé

Ce médicament est un **antibiotique**

Il ne doit pas être interrompu sans avis médical

INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES



Si vous prenez les médicaments suivants,

Fer	TARDYFERON® TIMOFEROL® INOFER®	Laisser un intervalle de 2h entre ces médicaments et la Lévofloxacine (Tavanic®)
Zinc	EFFIZINC® RUBOZINC®	
Pansements digestifs	GAVISCON® CARBOLEVURE® SMECTA®	
Antiacides contenant du magnésium ou de l'aluminium	MAALOX® PHOSPHALUGEL® ROCGEL® KEAL®	
Cimétidine	CIMETIDINE®	
Ciclosporine	NEORAL ® SANDIMMUN® Voie intra-veineuse	Dosage plasmatique et surveillance fonction rénale pendant le traitement et à l'arrêt du traitement
Anti-Vitamines K (AVK)		
Fluidione Warfarine Acénocoumarol	PREVISCAN® COUMADINE® SINTROM®	Réaliser des INR plus fréquemment

Liste non exhaustive

VOTRE POSOLOGIE

..... comprimé(s) à mg
 fois par jour **au cours ou en dehors d'un repas**

Matin Midi Soir

Pendant jours
 Jusqu'au/...../.....

EN CAS D'OUBLI

Si vous avez oublié de prendre une dose, prenez la suivante à l'heure habituelle.

Ne pas doubler la dose suivante pour compenser la dose oubliée



EN CAS DE VOMISSEMENTS

Si vomissements jusqu'à **1 heure** après la prise :

➡ reprendre l'antibiotique

Si vomissements plus de **1 heure** après la prise :

➡ ne pas reprendre l'antibiotique

Pendant la durée de votre traitement, **signaler** la prise de ce traitement à tout professionnel de santé que vous consultez.

Ne pas arrêter la prise de ce médicament **avant la date de fin** prescrite par votre médecin.

En cas d'arrêt prématuré du médicament, risque : de reprise de l'infection, d'aggravation de l'état de santé, d'augmentation des résistances de la bactérie.

EFFETS INDÉSIRABLES

Douleurs musculaires, articulaires, tendinites : tendon d'Achille +++ mais tous les tendons peuvent être touchés

Cutanés : Eruptions cutanées, urticaires, démangeaisons, **photosensibilisation**

Neurologiques : Maux de tête, vertiges, somnolence, insomnie, convulsions, troubles de la vision

Digestifs : Diarrhées, vomissements, nausées

Biologiques : Perturbation au niveau foie, du rein, du bilan sanguin et du potassium

Cardiaques : Palpitations

Liste non exhaustive

PRÉCAUTIONS

Goût métallique dans la bouche : Prise pendant repas ou collation

Douleurs, inflammations tendons (surtout au niveau du pied) pendant et jusqu'à plusieurs mois après l'arrêt
 Sensation battements du cœur irréguliers ou rapides

Eviter l'exposition au soleil pendant le traitement et les 2 jours suivant l'arrêt.

En cas d'exposition: Se couvrir (chapeaux, vêtements longs), crème solaire indice IP50+

Avis médical



Diabétique, risque d'hypoglycémie ou d'hyperglycémie : Surveiller fréquemment la glycémie

Attention à la conduite (somnolence)



